

## ● キュウメタシンパップZ

## 【使用上の注意】

 使用上の注意 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
  - (3) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないで下さい。
  - (1) 目の周囲、粘膜等
  - (2) しっしん、かぶれ、傷口
  - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 連続して2週間以上使用しないで下さい。



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

## 【解 説】

1.
    - (1) 共通事項解説〔1〕参照
    - (2) 医療用非ステロイド性消炎鎮痛剤外用剤にはぜんそく発作の注意が記載されています。本剤には非ステロイド性消炎鎮痛剤のインドメタシンが配合されているので、ぜんそく発作の既往歴のある人は使用しないよう注意が必要です。
    - (3) 本剤は小児への使用経験が少なく、安全性が確立していないため、15歳未満の小児には使用しないで下さい。
  2.
    - (1) (2) これらの部位に使用すると、強い刺激感や痛みがあらわれたり、症状が悪化するおそれがあります。
    - (3) みずむし・たむし等の白癬症や化膿など感染症に対しては無効であり、かえって症状が悪化するおそれがあります。
  3. 共通事項解説〔3〕参照
1.
    - (1) 共通事項解説〔4〕参照
    - (2) 共通事項解説〔5〕参照
    - (3) 共通事項解説〔7〕参照

## ● キュウメタシンパップZ

### 【使用上の注意】

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状                                |
|------|------------------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 【使用法に関連する注意】

1. 使用法を厳守して下さい。
2. 15歳未満の小児に使用させないで下さい。
3. 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。
4. 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
5. 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。

### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
5. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

### 【解 説】

2. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等がわかる外箱を持参の上、専門家に相談する必要があります。

3. 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は、他の疾患が原因のことも考えられますので、使用を中止して専門家に相談する必要があります。

1. 共通事項解説〔9〕参照
2. 本剤は小児への使用経験が少なく、安全性が確立していないため、15歳未満の小児には使用しないで下さい。
3. 皮膚の弱い人では、発疹・発赤、かゆみ等の症状が起こりやすいので、本剤の使用による過敏症状を未然に防ぐため、使用前に確認することをお勧めしています。
4. 本剤は痛みやはれ等の対症療法に使う薬剤です。これらの症状の原因が骨や関節等の障害にある場合は根本的な治療が必要です。
5. 患部がぬれたまま使用すると、かぶれやはがれの原因となることもあります

1. 共通事項解説〔11〕参照
2. 共通事項解説〔12〕参照
3. 共通事項解説〔13〕参照
4. シップ剤は外気に触れて乾燥すると粘着力が悪くなり、品質も劣化しますので、品質を保持するため、開封後の保管方法を記載しています。
5. 共通事項解説〔17〕参照