

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ルルAプレミアム（45錠PTP）
2	成分・分量	9錠中 クレマスチンフマル酸 1.34mg、ベラドンナ総アルカロイド 0.6mg、 ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg、トラネキサム酸 750mg、アセトアミノフェン 900mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg ※添加物は外箱を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用して下さい。 成人（15歳以上）：3錠 11歳以上15歳未満：2錠 7歳以上11歳未満：1錠 7歳未満 服用しないで下さい。
4	効能・効果	かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、せき、たん、悪寒、頭痛、くしゃみ、 関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	- 次の人は服用しないで下さい。 （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 （2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 （鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬、トラネキサム酸 を含有する内服薬 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。 - 服用前後は飲酒しないで下さい。 - 長期連用しないで下さい。 - 過量服用しないで下さい。 次に該当する人はお申し出下さい。 （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人 （3）授乳中の人 （4）高齢者 （5）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 （6）次の症状のある人 高熱、排尿困難 （7）次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、 緑内障、血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等）、 血栓症を起こすおそれのある人 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。