

医薬品を正しく購入するための 説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ルルアタック EX / ルルアタック EX 顆粒
2	成分・分量	6錠/3包中 トラネキサム酸 750mg、イブプロフェン 450mg、 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチンとして1mg）、 ブロムヘキシン塩酸塩 12mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、 ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、チアミン硝化物（ビタミン B ₁ 硝酸塩） 25mg、 リボフラビン（ビタミン B ₂ ） 12mg 〈成分・分量に関連する注意〉 本剤に配合されているリボフラビン（ビタミン B ₂ ）により、尿が黄色になることがあります。 ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用して下さい。 成人（15歳以上）：2錠/1包 15歳未満：服用しないで下さい。
4	効能・効果	かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、 関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止す るために必要 な事項	1. 次の人は服用しないで下さい。 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15歳未満の小児 (4) <u>出産予定日12週以内の妊婦</u> (5) フェニルケトン尿症の人（※顆粒のみ：L-フェニルアラニン化合物を含有するため） 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 （鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、トラネキサム酸を含有する内服薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 5. 服用前後は飲酒しないで下さい。 6. 5日間を超えて服用しないで下さい。 7. <u>過量服用しないで下さい。</u> 次に該当する人はお申し出下さい。 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人：高熱、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、 緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、 血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等）、 血栓症を起こすおそれのある人、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 (7) 次の病気にかかったことのある人：胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断す る事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。