

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 名称 | ルルダイレクトS錠 |
| 2 | 成分・分量 | 6錠中 ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、ノスカピン 60mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg、L-カルボシステイン 750mg ※添加物は外箱を参照 |
| 3 | 用法・用量 | 次の1回量を1日3回、食後に服用してください。 成人（15歳以上）：2錠 12歳以上15歳未満：1錠 12歳未満 服用しないでください。 |
| 4 | 効能・効果 | せき、たん |
| 5 | 保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項 | <p>1. 次の人は服用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)12歳未満の小児</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 （鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。</p> <p>5. 過量服用・長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人 高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人 (7)次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、肝臓病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、 閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</p> <p>【12歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】</p> |
| 6 | 薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。