

Products for the oral cavity and throat **6錠 1日分**

製品情報 Product Info



薬用

新ルルエーストローチ^S

薬用

新ルルエーストローチ^S

6錠 1日分



実物大

のどの痛み・はれに

殺菌成分 **CPC** セチルピリジニウム塩化物水合物

＋ 炎症を抑える成分の

ダブル処方



キキョウ

指定医薬部外品



第一三共ヘルスケア

Daichi-Sankyo

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
<input type="checkbox"/>	刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〈成分・分量〉 6錠中

セチルピリジニウム塩化物水合物・・・・・・・・・・ 6mg
 キキョウエキス・・・・・・ 150mg (原生薬として600mg)
 添加物：白糖、還元麦芽糖水アメ、無水ケイ酸、ゼラチン、アラビアゴム、パラベン、黄色5号、ステアリン酸Ca、香料

〈効能・効果〉

- のどの炎症による次の症状：のどの痛み・のどのはれ・のどのおれ・声がれ・のどの不快感
- 口腔内の殺菌・消毒 ○口臭の除去

〈用法・用量〉

年齢	1回量	1日使用回数
成人 (15歳以上)	1錠	6回 2時間以上の間隔を おいて口中に含み、かまずに ゆっくり溶かして下さい。
5歳以上15歳未満		
5 歳 未 満	使用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 5歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- 本剤はトローチですので、かみくだいたり、そのまま飲み込んだりしないで下さい。
- 錠剤の取り出し方：図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
 〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
 お問い合わせ先：お客様相談室 0120-337-336
 受付時間 9：00～17：00 (土、祝日を除く)
<https://www.daichisankyo-hc.co.jp/>
 製造 日新薬品工業株式会社
 販売元 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1



新ルルエーストローチs

指定医薬部外品

□腔咽喉薬

MADE IN JAPAN 01®登録商標

〈保管及び取扱い上の注意〉 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります) (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、開封した後は、なるべく早く使用して下さい。



4 987107 637635