

- マキロン アクネージュ メディカルクリーム
- マキロン アクネージュ メディカルローション

【使用上の注意】

 使用上の注意

 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

目や目の周囲

▶マキロン アクネージュ メディカルローション



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 湿潤やただれのひどい人
- (5) 深い傷やひどいやけどの人
- (6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人
▶マキロン アクネージュ メディカルローション

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(ヒリヒリ感)*、はれ(腫脹)*、乾燥化(つっぱり感)**

※マキロン アクネージュ メディカルクリーム

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

▶マキロン アクネージュ メディカルクリーム

【解 説】

目の周囲は感受性が強く、本剤を使用することにより、刺激感が強くあらわれたり、症状が悪化するおそれがあります。

1.
 - (1) 共通解説事項〔4〕参照
 - (2) 共通解説事項〔7〕参照
 - (3) 患部が広範囲な場合は、できるだけ早く医師の治療を受けることが望ましい場合が多いので、自己判断で薬を塗布しないよう注意喚起しています。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人が本剤を塗布すると刺激感が強くあらわれたり、症状が悪化するおそれがあります。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの場合は、細菌による感染や深部組織の損傷のおそれもありますので、専門医を受診して的確な投薬や処置を受ける必要があります。
 - (6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人は、できるだけ早く専門医を受診して的確な投薬や処置を受ける必要があります。
2. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等がわかる添付文書を持参のうえ、専門家に相談する必要があります。
3. 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は、他の疾患や合併症も考えられるので、使用を中止し、専門家に相談する必要があります。

- マキロン アクネージュ メディカルクリーム
- マキロン アクネージュ メディカルローション

【使用上の注意】

3'. 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

▶マキロン アクネージュ メディカルローション

4. その他

(1) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止して下さい。

▶マキロン アクネージュ メディカルローション

(2) 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止して下さい。再び使用するときは間隔を空けて使用して下さい。

▶マキロン アクネージュ メディカルローション

【使用法に関連する注意】

1. 使用法を厳守して下さい。

2. 1回の使用量はコットン等がしっかりとぬれるくらい(薬液がたれない程度)が目安です。

▶マキロン アクネージュ メディカルローション

3. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

4. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。

5. 本剤はにきび、吹き出物のある部分にのみ使用し、周辺の広い部分には使用しないで下さい。

▶マキロン アクネージュ メディカルクリーム

6. 外用にのみ使用して下さい。

【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。

2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。

3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

【解 説】

3'. 2週間位使用しても症状の改善がみられない場合は、他の疾患や合併症も考えられるので、使用を中止し、専門家に相談する必要があります。

4.

(1) 傷口のある患部に本剤を塗布すると刺激感が強くあらわれたり、症状が悪化するおそれがありますので、必要に応じて使用を中止して下さい。

(2) サリチル酸により、一時的に感じるがあります。その場合は使用を一時中止し、症状が治まってから使用して下さい。

1. 共通解説事項〔8〕参照

2. 1回の使用量の目安の説明です。

3. 共通解説事項〔9〕参照

4. 本剤が万が一、目に入った場合、強い刺激を感じると共に、充血を起し腫脹をきたす等が考えられます。このような場合は直ちに目を水で洗い流し、薬を取り除いて下さい。また、水洗いしても刺激がいつまでも続いたり、涙が止まらない場合には、眼科医の診療を受けて下さい。

5. にきび、吹き出物のある部分以外の周辺の広い部分に使用すると副作用があらわれるおそれがあります。

6. 定められた投与経路、適用部位以外への使用は、思わぬ副作用や事故が発生するおそれがあります。

1. 共通解説事項〔11〕参照

2. 共通解説事項〔12〕参照

3. 共通解説事項〔13〕参照

- マキロン アクネージュ メディカルクリーム
- マキロン アクネージュ メディカルローション

【使用上の注意】

4. 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)
▶マキロン アクネージュ メディカルローション
5. 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
6. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【解 説】

4. 高温になる場所に放置すると、容器が変形したり、液もれがおこるおそれがあるので注意が必要です。
5. 本剤に有機溶剤が含まれているため、本剤が付着すると化学繊維、プラスチック類、塗装面等を変質、変色させる場合があります。
6. 共通解説事項〔17〕参照