



貼るかゆみどめ

半透明  
パッチ  
24  
枚入りマキロン®  
パッチエース赤くはれた  
虫さされ、かゆみに

第2類医薬品 殺菌剤配合

- 水につよく、ムレにくい
  - お子様のかきこわし防止
- デキサメタゾン酢酸エステル配合



第一三共ヘルスケア

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10製造 救急薬品工業株式会社  
販売元 富山県射水市戸破32-7

●この箱は環境に優しいベジタブルインキを使用しています。

H

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 使用上の注意

- ×してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないで下さい。(1)水瘡(水ぼうそう)、みずむしたむし等又は化膿している患部 (2)目の周囲、粘膜等 (3)臍、湿潤(かきこわし)、ただれ、しっしん、かぶれ (2.顔面には、広範囲に使用しないで下さい。3.長期連用しないで下さい。

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありまので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむしたむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、かぶれ、色素沈着

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

虫さされによるかゆみに  
マキロンパッチエース

鎮痒消炎症薬

第2類医薬品

(成分・分量)本品の膏体100g(1.25m<sup>2</sup>)中

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。(抗炎症剤)
ジフェニドラン	1.00g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.50g	血行促進作用により、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物:アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、メントール  
本剤は、副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

(効能・効果) 虫さされによるかゆみ

(用法) 1日1〜3回患部に貼って下さい。

(使用法に関連する注意) (1)使用法を厳守して下さい。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3)外用にのみ使用して下さい。  
(4)汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5)長時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。(6)同じ場所に長時間の使用はしないで下さい。

(保存及び取扱上の注意) (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

(包装) 24枚(直径2.0cm×24枚)

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

使用期限

製造番号



(お風呂に合わせ先) 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10 税目:薬(徴)  
受付時間:9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)  
④登録商標  
https://www.daichisanryo-hc.co.jp/

