



貼る

かゆみどめ

マキロン®パッチエース

【抗炎症成分配合】

赤くはれた

虫さされのかゆみを
鎮める第2類
医薬品

第一三共ヘルスケア

(お問い合わせ先) 第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

02◎登録商標

マキロン®パッチエース

第2類医薬品

第2類医薬品

開封口

使用前にこの箱の説明文
書を必ずお読み下さい。鎮痒消炎薬
マキロンパッチエース【効能・効果】
虫さされによるかゆみ

⚠️ 使用上の注意

- ❌【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- 次の部位には使用しないで下さい。(1)水疱(水ぼうそう)、みずむし(たむし)等又は化膿している患部 (2)目の周囲、粘膜等 (3)傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、ししん、かぶれ (4)顔面には、広範囲に使用しないで下さい。 3.長期連用しないで下さい。

💡相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、かぶれ、色素沈着
- 5~6日間使用しても症状がよくなるらない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(成分・分量)本品の膏体100g(1.25m²m²)中

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。(抗炎症剤)
ジフェンヒドラミン	1.00g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.50g	血行促進作用により、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物:アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸、アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、トメントール

副剤:皮膚ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

【用法】1日1~3回患部に貼って下さい。(使用法に関連する注意)(1)使用方法を厳守して下さい。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3)外用にのみ使用して下さい。(4)汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5)長時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。(6)同じ場所に長時間の使用はしないで下さい。

【保管及び取扱以上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。【包装】24枚(直径2.0cm×24枚)

使用期限

製造番号

4 987107 620521