

<鎮痛消炎シップ剤>

1枚あたり 10cm×14cm 膏体量7g

パテックス[®]うすびた[®]シップ_α



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) しっしん、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫

用法・用量

そのまま、または適当な大きさに切り、表面のフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋 3-14-10

製造販売元

救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破 32-7

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
サリチル酸グリコール	2.0g	炎症をおさえ、痛みをやわらげます。
l-メントール	1.3g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
トコフェロール酢酸エステル	1.0g	血行を促進し、痛みをやわらげます。

添加物：D-ソルビトール液、1,3-ブチレングリコール、ポリアクリル酸部分中和物、pH調節剤、ゼラチン、カルメロースNa、ポリソルベート80、酸化チタン、エデト酸Na、水酸化Al
[1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量7g]

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋 3-14-10

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daichisankyo-hc.co.jp/>

使用期限

製造番号



副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN



01 ©登録商標