

- パテックス うすびたシップα
- パテックス うすびたシップ
- パテックス うすびたシップEX

【使用上の注意】

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

1. 目の周囲、粘膜等
2. しっしん、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【用法・用量に関連する注意】

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
3. 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。

【成分・分量に関連する注意】

本剤は生薬を配合しておりますので、色調が多少異なることもあります。効果に変わりはありません。

- ▶パテックスうすびたシップ
- ▶パテックスうすびたシップEX

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

【解 説】

- 1.2. これらの部位に本剤を使用すると、強い刺激感や痛みがあらわれたり、症状が悪化するおそれがあります。

1. 共通事項解説〔7〕参照
2. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等がわかる外箱を持参の上、専門家に相談する必要があります。
3. 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は、他の疾患が原因のことも考えられますので、使用を中止して専門家に相談する必要があります。

1. 共通事項解説〔8〕参照
2. 共通事項解説〔9〕参照
3. 患部がぬれたまま使用すると、かぶれやはがれの原因となることもあります。

天然物(生薬)を配合した製剤であることより色調にバラつきがありますが規格の範囲内であり、効果に影響しないことを記載しています。

1. 共通事項解説〔11〕参照

- パテックス うすびたシップα
- パテックス うすびたシップ
- パテックス うすびたシップEX

【使用上の注意】

2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
5. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【解 説】

2. 共通事項解説〔12〕参照
3. 共通事項解説〔13〕参照
4. シップ剤は外気にふれて乾燥すると粘着力が悪くなり、品質も劣化しますので、品質を保持するため、開封後の保管方法を記載しています。
5. 共通事項解説〔17〕参照