

# 医薬品を正しく購入するための 説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ピロエース W パウダースプレー
2	成分・分量	70g 中 ピロールニトリン 20mg(力価)、クロトリマゾール 40mg、クロタミトン 500mg、 l-メントール 100mg  <成分・分量に関連する注意> (1) 本剤はアルコールを含んでいますのでしみることがあります。 (2) 塗布後ほてり(熱感)を感じるがありますが、短時間のうちに消失します。 ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	1日 2~3回、適量を患部に噴霧して下さい。  <用法・用量に関連する注意> (1) 使用法を厳守して下さい。 (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。 (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。 (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。 (5) 外用にのみ使用して下さい。 (6) 使用前によく振ってから使用して下さい。 (7) 患部まで約 10cm の距離で噴霧して下さい。 (8) 凍傷になる恐れがありますので、同じ箇所に連続して 1 秒以上噴霧しないで下さい。 (9) 内容物の残量が少なくなったときに、缶を横向きの状態で使用すると、出にくくなる ことがあります。
4	効能・効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次の部位には使用しないで下さい。 (1) 目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等 (2) しっしん (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部  次に該当する人はお申し出下さい。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 乳幼児 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人 (5) 患部が化膿している人 (6) 「しっしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人 (陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しっしん等他の原因による場合が多い)
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。