

医薬品を正しく購入するための 説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ピロエースZクリーム
2	成分・分量	100g中 ラノコナゾール 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.3g、 クロタミトン 5.0g、グリチルレチン酸 0.5g、メントール 1.0g 塗布後ほてり(熱感)を感じることがありますが、短時間のうちに消失します。 ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	1日1回、適量を患部に塗布して下さい。 <用法・用量に関連する注意> 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p>患部をよく洗ってから患部より広めに薬剤を塗布して下さい。菌の増殖や二次感染を防ぐため患部を清潔に保ちましょう。足は不潔になりやすいので特に清潔にして下さい。また、再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなっても2~4週間は治療を続けることが大切です。</p></div>
4	効能・効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないで下さい。 本剤又は本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人 2. 次の部位には使用しないで下さい。 (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等 (2)しっしん (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部 次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)乳幼児 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が顔面又は広範囲の人 (5)患部が化膿している人 (6)「しっしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人 (陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しっしん等他の原因による場合が多い) (7)妊婦又は妊娠していると思われる人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。