

医薬品を正しく購入するための  
説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サリドンエース
2	成分・分量	2錠中 エテンザミド 500mg、アセトアミノフェン 220mg、ブロモバレリル尿素 200mg、 無水カフェイン 50mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を、1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。 (服用間隔は6時間以上おいて下さい) 大人(15歳以上):2錠 7歳以上15歳未満:1錠 7歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	○頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉(いんこう)痛・耳痛・関節痛・神経痛・ 腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 ○悪寒(おかん)・発熱時の解熱
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。 4. 服用前後は飲酒しないで下さい。 5. 長期連用しないで下さい。 6. 過量服用しないで下さい。 次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある 乳・幼・小児(15歳未満) (4)高齢者 (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)次の診断を受けた人:心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。