

医薬品を正しく購入するための 説明文書

第3類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トラフル錠
2	成分・分量	<p>6錠中 トラネキサム酸 750mg、カンゾウ乾燥エキス 198mg(原生薬として 990mg)、 ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B₆) 50mg、リボフラビン(ビタミン B₂) 12mg、 L-アスコルビン酸ナトリウム(ビタミン C ナトリウム) 500mg</p> <p><成分・分量に関連する注意> (1)本剤に配合されているリボフラビン(ビタミン B₂)により、尿が黄色になることがあります。 (2)本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミン C を含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。 ※添加物は外箱、添付文書を参照</p>
3	用法・用量	<p>次の1回量を1日3回、朝昼晩に服用して下さい。 成人(15歳以上):2錠 7歳以上15歳未満:1錠 7歳未満:服用しないで下さい。</p> <p><用法・用量に関連する注意> 食前・食後、いずれの服用でもかまいません。</p>
4	効能・効果	口内炎、咽頭炎・扁桃炎(のどのはれ、のどの痛み)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。 (1)甘草(カンゾウ)又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬 (むくみ、血圧上昇及び筋疾患(ミオパチー)等が起こることがあります) (2)トラネキサム酸を含有する内服薬 (鼻炎用内服薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等)</p> <p>2. 長期連用しないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人 むくみ (6)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等)、 血栓症を起こすおそれのある人</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。