

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第3類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 名称 | トラフルBBチャージc |
| 2 | 成分・分量 | <p>2錠中 リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル) 20mg、 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 100mg、アスコルビン酸(ビタミンC) 110mg、 L-システイン 40mg、ニコチン酸アミド 60mg、 ビオチン(ビタミンH) 0.2mg</p> <p>〈成分・分量に関連する注意〉 (1)本剤に配合されているビタミンB₂酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。 (2)本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。 ※添加物は外箱、添付文書を参照</p> |
| 3 | 用法・用量 | <p>次の1回量を1日1回、服用して下さい。 成人(15歳以上):2錠 7歳以上15歳未満:1錠 7歳未満:服用しないで下さい。</p> <p>〈用法・用量に関連する注意〉 食前・食後にかかわらず、服用していただけます。</p> |
| 4 | 効能・効果 | <p>○次の諸症状の緩和: 口内炎、舌の炎症、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、 口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、肌あれ、にきび・吹き出物、皮膚炎、湿疹、かぶれ、 ただれ 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、 医師又は薬剤師に相談して下さい」</p> <p>○次の場合のビタミン B₂B₆ の補給: 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時</p> |
| 5 | 保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項 | |
| 6 | 薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。