

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トラフルダイレクトa
2	成分・分量	1 枚中:トリアムシノロンアセトニド・・・0.025mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	成人(15 歳以上)、小児(5 歳以上): 1 患部に、1 回 1 枚、1 日 1~2 回 白色面を患部粘膜に付着させて用います。 5 歳未満: 使用しないで下さい。
4	効能・効果	口内炎(アフタ性)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないで下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 感染性の口内炎が疑われる人(医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ガーゼなどで擦ると容易にはがすことのできる白斑が口腔内全体に広がっている人(カンジダ感染症が疑われます)</li> <li>・ 患部に黄色い膿がある人(細菌感染症が疑われます)</li> <li>・ 口腔内に米粒大~小豆大の小水疱が多発している人、口腔粘膜以外の口唇、皮膚にも水疱、発疹がある人(ウイルス感染症が疑われます)</li> <li>・ 発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹などの全身症状がみられる人(ウイルス感染症が疑われます)</li> </ul> </li> <li>(2) 口腔内に感染を伴っている人 (ステロイド剤の使用により感染症が悪化したとの報告があることから、歯槽膿漏、歯肉炎等の口腔内感染がある部位には使用しないで下さい)</li> <li>(3) 5 日間使用しても症状の改善がみられない人</li> <li>(4) 1~2 日間使用して症状の悪化がみられる人</li> </ul> <p>次に該当する人はお申し出下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人</li> <li>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>(3) 授乳中の人</li> <li>(4) 高齢者</li> <li>(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>(6) 患部が広範囲(患部を本剤でおおいきれない)にある人</li> </ul>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。