

- トランシーノ ホワイトCクリア
- トランシーノ ホワイトCプレミアム
- システィナC II ● システィナC

## 【使用上の注意】

### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
    - ▶ トランシーノ ホワイトCクリア
    - ▶ トランシーノ ホワイトCプレミアム
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
    - ▶ トランシーノ ホワイトCクリア
    - ▶ トランシーノ ホワイトCプレミアム
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤 <sup>*</sup> 、かゆみ <sup>*</sup>
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感 <sup>*</sup> 、腹痛

  - ※ トランシーノ ホワイトCクリア、  
トランシーノ ホワイトCプレミアム
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 下痢、便秘<sup>\*</sup>
  - ※ トランシーノ ホワイトCクリア、  
トランシーノ ホワイトCプレミアム
4. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 【解 説】

1.
  - (1) 共通事項解説〔4〕参照
  - (2) 共通事項解説〔7〕参照
2. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに服用を中止し、服用している薬剤の成分等がわかる添付文書を持参の上、専門家に相談する必要があります。
3. 一過性の軽い副作用としてあらわれることがあります。直ちに服用を中止する必要はありませんが、症状が持続したり増強する場合は、服用を中止して専門家に相談する必要があります。
  - 下痢  
ビタミンC、ビタミンE、パントテン酸カルシウムにより、あらわれることがあります。
  - 便秘  
ビタミンEにより、あらわれることがあります。
4. 本剤は、比較的作用が穏やかで、ある程度長期服用することによって、本来の効果が得られる性質の製剤です。効果のあらわれ方は、症状や服用する人の体質・体の状態などにより異なります。本剤を1カ月位服用しても効果がみられない場合には、他の疾患が原因の可能性も考えられるので、服用を中止し専門家に相談する必要があります。

- トランシーノ ホワイトCクリア
- トランシーノ ホワイトCプレミアム
- システィナC II ● システィナC

### 【使用上の注意】

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- ▶ トランシーノ ホワイトCクリア
  - ▶ トランシーノ ホワイトCプレミアム

### 【用法・用量に関連する注意】

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 食前・食後、いずれの服用でもかまいません。  
▶ トランシーノ ホワイトCプレミアム  
▶ システィナC
- 2'. 食前・食後にかかわらず、服用していただけます。  
▶ トランシーノ ホワイトCクリア
3. 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

### 【成分・分量に関連する注意】

1. 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。  
医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
2. 本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)により、尿が黄色になることがあります。  
▶ トランシーノ ホワイトCクリア  
▶ トランシーノ ホワイトCプレミアム

### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に〔密栓して〕保管して下さい。〔なお、服用のつどビンのフタをしっかりとめて下さい。〕
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

### 【解 説】

5. ビタミンEは、下垂体や副腎系に作用してホルモンの分泌を調整する作用が知られています。この作用により、ときに生理(月経)が早くきたり、経血量が多くなったりすることがあります。また、更年期の女性では一度閉経した後でも、ビタミンEの服用により再び生理がはじまることもあります。これらの現象は内分泌のバランス調整による一時的なもので、病的なものではないので、本剤の服用を続けても差し支えありません。但し、出血が長く続く場合は他の原因による性器出血も考えられるので、専門家に相談する必要があります。

1. 共通事項解説〔8〕参照
2. 本剤の服用時間については、特に決まりはありません。

3. 共通事項解説〔9〕参照

1. ビタミンCには還元作用があるので、還元作用や酸化作用を利用した尿や大便の検査(例えば尿糖検査や便潜血反応等)に対して、その検査を妨害することがあるため、注意が必要です。
2. リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)は黄色～だいたい黄色の結晶で、服用後に吸収され、その一部が尿中に排泄されるので、尿が黄色くなることがあります。

1. 共通事項解説〔11〕参照
2. 共通事項解説〔12〕参照
3. 共通事項解説〔13〕参照

- トランシーノ ホワイトCクリア
- トランシーノ ホワイトCプレミアム
- システィナCⅡ ● システィナC

### 【使用上の注意】

4. 容器のキャップのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずキャップをしっかりしめて下さい。  
▶ トランシーノ ホワイトCクリア  
▶ トランシーノ ホワイトCプレミアム  
▶ システィナCⅡ
5. ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
6. ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
7. ビンの中に乾燥剤/脱臭剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違って服用しないよう注意して下さい。
8. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。  
▶ トランシーノ ホワイトCクリア  
▶ トランシーノ ホワイトCプレミアム
- 8'. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、ビンを開封した後は6カ月以内に使用して下さい。  
▶ システィナCⅡ  
▶ システィナC
9. 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入して下さい。  
▶ システィナCⅡ  
▶ システィナC

### 【解 説】

4. キャップのしめ方が不十分な場合、吸湿等により薬剤が変質し、品質保持の面にも効果の面にも悪影響を及ぼすおそれがあるため、キャップをしっかりしめる必要があります。
5. 共通事項解説〔14〕参照
6. 共通事項解説〔15〕参照
7. 共通事項解説〔16〕参照
8. 共通事項解説〔17〕参照
- 8'. 一度、開封した製品は、吸湿等により徐々に品質が劣化しますので、品質保持の点から6カ月以内に服用する必要があります。
9. 服用可能な期間を確認していただくために、最初に開封した日付を記入する欄を外箱に設けています。