

使用前请务必阅读本说明书。
同时应对此说明书进行妥善保管，以便在必要时随时取阅。

指定第 2 类医药品

缓解由于花粉造成的鼻塞、鼻涕、打喷嚏

AG Allercut[®] EXc 〈专用于季节性过敏症状〉

含 0.1% 丙酸倍氯米松（类固醇）的滴鼻药

AG Allercut EXc 〈专用于季节性过敏症状〉的特点

1. “丙酸倍氯米松”同时拥有抗炎与抗过敏作用，直接作用于鼻部黏膜，抑制花粉造成的难耐鼻塞、鼻涕及打喷嚏。
2. 早上使用效果持续到傍晚，傍晚使用则效果持续到早上。（通常 1 天使用 2 次时）
3. 舒适清凉使用感，滞留于患处且不易滴流。
4. 采用可从任何角度喷雾，最后可以彻底用完的喷雾容器。
5. 可同时与鼻炎用内服药及滴眼药水并用。



使用注意事项



禁止事项（若不遵守可能会导致目前的症状恶化或容易产生副作用）

1. 以下人群请勿使用。

(1) 被诊断出患有以下疾病者

全身性真菌感染、结核性疾病、高血压、糖尿病、反复性鼻出血、哮喘、青光眼、感染性疾病

(2) 鼻腔化脓（毛孔感染引发的脓液积聚并出现肿痛）的患者

(3) 曾因本剂或本剂所含成分而引发过过敏症状者

(4) 未满 18 岁者

(5) 孕妇或有可能怀孕者

(6) 过去 1 年内曾累计使用类固醇类滴鼻剂 3 个月以上者

2. 1 年以内，请不要累计使用本品和其他类固醇类滴鼻药 3 个月以上。（如需使用 3 个月以上时，有可能患有其他疾病，请咨询耳鼻喉专科医师）

3. 使用完本品后请勿使用其他类固醇类滴鼻药。但若医师开出此类药品时，请遵循医嘱用药。



咨询事项

1. 以下人群请在使用前咨询医师、药剂师或登录销售者。

(1) 正在接受医师治疗者

(2) 正接受脱敏疗法和过敏治疗的人群

(3) 头部、额头和脸颊等部位有痛感，且流出黄色或绿色鼻涕的患者（感染性鼻窦炎）

(4) 哺乳期患者

(5) 曾对药物等产生过敏症状者

(6) 无法确定症状的诱因是否来自季节性过敏症的患者

(7) 高龄者

(8) 患有肥厚性鼻炎^{*1} 或鼻痔（鼻息肉）^{*2} 的患者

※1：鼻腔附近有胀痛感，有少量粘稠或黄色、绿色的鼻涕流出。

※2：鼻塞、鼻音重、鼻腔深处有异物感。

(9) 正在接受长期或大范围全身性类固醇疗法的患者

2. 使用后出现以下症状时可能为副作用。此情形时，请立即停止使用，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。

相 关 部 位	症 状
鼻 子	流鼻血、鼻腔中疮痂、刺痛感、发痒、干燥感、不适感、打喷嚏、嗅觉异常、化脓症状（毛根感染引发的脓液积聚并出现肿痛）
咽 喉	刺痛感、异物感、化脓症状（因感染，咽喉深处积聚白色脓液并出现肿痛）
皮 肤	发疹、发红、发痒、肿胀
精神神经系统	头痛、头晕
消 化 器 官	恶心、呕吐、腹泻、食欲不佳
其 他	哮喘、眼睛疼痛、眼睛模糊、心悸、血压上升

极少可能会引发下列严重症状。该情况下，请立刻接受医师诊疗。

症状名称	症状
休克 (过敏性)	使用后马上出现皮肤痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。

- 使用后若头部、额头及脸颊等疼痛，鼻涕呈黄色及绿色，出现与平时不同的症状时，请立即停止使用本品，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。
(有可能为其他疾病的并发病状)
- 使用1周左右(1天最多4次(喷雾8次))症状并无改善时，请停止使用本品，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。

功效

缓解因花粉造成的季节性过敏的以下症状：鼻塞、鼻涕(鼻涕过多)、打喷嚏

用法及用量

年龄	1次用量	1天使用次数
成人(18岁或以上)	向左右鼻腔内各喷1次	通常使用2次(早·晚)
未满18岁	请勿使用。	

1天最多可使用4次(喷雾8次)，但需保证间隔3小时以上。

- 症状有所改善后请减少使用次数。
如症状再次出现恶化，可以增加使用次数。
- 1年内请勿累计使用本品3个月以上。

〈用法及用量相关注意事项〉

- 本药剂含有丙酸倍氯米松(类固醇)，使用过量或使用错误很有可能导致出现副作用，因此请严格遵守用法及用量。
- 请仅限使用于滴鼻。
- 使用时若嘴中感觉有味道时，请漱口。

〈使用方法〉

<p>①</p> <p>鼻腔化脓时，请勿使用。</p>	<p>②</p> <p>使用前请轻轻将鼻涕擦干净。 (擤鼻子时不要过于用力)</p>	<p>③</p> <p>取下蓝色的盖子，如图所示拿好容器。 (初次使用本品时，请按压数次排出空气，直至药液喷雾)</p>	<p>④</p> <p>将喷头轻轻放入鼻腔，喷射1次药液。请用相同的操作在另一侧鼻腔中喷雾。</p>	<p>⑤</p> <p>使用后请将喷头周围用干净的纸巾等擦拭后，盖好瓶盖。</p>
-----------------------------	--	--	--	---

- 若容器前端接触鼻涕等时，请注意有可能使药液污染。
- 保持喷头不要面向鼻中隔*请直接将喷头插入鼻腔内。
请注意，右撇子使用时喷头容易朝向右侧的鼻中隔，左撇子使用时喷头容易朝向左侧的鼻中隔。
*鼻中隔：鼻孔中将鼻腔隔成左右的隔板
- 使用后请用纸巾等擦拭喷头周围，保持清洁。
- 请勿用针头等戳喷头前端，若针头折断时非常危险。

成分及含量

本药剂为白色悬油性粘稠液体，每100g中含有以下成分。

成分	含量	作用
Beclomethasone Dipropionate	0.1 g	作用于鼻黏膜，抑制鼻塞、鼻涕等症状。

添加剂：Carboxyvinyl Polymer, L-Arginine, Ethanol, Tonicity Agent, Benzalkonium Chloride, Edetate Sodium, Mentha Oil, I-Menthol, Polysorbate 80, pH adjuster

〈成分及含量相关注意事项〉本药剂含有酒精，有时会感到刺痛。

保管及使用上的注意事项

- 请将盖子盖好后保管于阳光直射不到的阴凉处。
- 请保管于儿童触及不到的地方。
- 请勿换装于其他容器。(可能导致误用或变质)
- 请勿与他人共用。

(5)请勿使用已超过所标识的使用期限的产品。即使在使用期限内，开封后也请尽快使用。

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。
第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室
邮编103-8234 东京都中央区日本桥3-14-10
电话号码：0120-337-336
受理时间：9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/q>

03®注册商标



Daiichi-Sankyo

销售商
第一三共医药保健株式会社
东京都中央区日本桥 3-14-10

生产销售商
东兴药品工业株式会社
富山县中新川郡立山町辻 20