

使用前请务必阅读本说明书。  
同时应对此说明书进行妥善保管，以便在必要时随时取阅。

## 第 2 类医药品

缓解花粉、屋尘等造成的眼部过敏症状

# AG Allercut<sup>®</sup> im

含色甘酸钠的滴眼药水

AG Allercut im 的特点

1. 抗过敏剂“色甘酸钠”抑制过敏介质的释放，缓解难耐过敏症状。
2. “马来酸氯苯那敏”阻止引发过敏症状的组胺受体结合，抑制眼部发痒。
3. “甘草酸二钾”，缓解因过敏带来的眼部炎症。
4. “硫酸软骨素钠”保持眼睛滋润，呵护角膜表面。
5. 本品为粘稠状药液。



## 使用注意事项



**禁止事项** (若不遵守可能会导致目前的症状恶化或容易产生副作用及事故)

### 1. 以下人群请勿使用。

曾因本剂或本剂所含成分而引发过敏症状者

### 2. 与滴鼻药并用时，使用后请勿驾驶车辆或操作机械类。

(会产生嗜睡等情况)



## 咨询事项

### 1. 以下人群请在使用前咨询医师、药剂师或登录销售者。

- (1)正在接受医师治疗者
- (2)正接受脱敏疗法和过敏治疗的人群
- (3)孕妇或有可能怀孕者
- (4)曾对药物等产生过敏症状者
- (5)有以下症状者：眼部剧烈疼痛
- (6)被诊断出患有以下疾病者：青光眼
- (7)无法确定症状的诱因是否来自过敏反应者

特别是下列无法判断究竟是否是由过敏反应引发的症状时，使用前请咨询医师。

- 只有一只眼睛出现问题时
- 只有眼部出现问题，鼻子没有出现相应症状时
- 对视力也产生影响时

### 2. 使用后出现以下症状时可能为副作用。此情形时，请立即停止使用，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒
眼睛	充血、发痒、肿胀、疼痛

极少可能会引发下列严重症状。该情况下，请立刻接受医师诊疗。

症状名称	症状
休克 (过敏性)	使用后马上出现皮肤痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。

### 3. 使用后出现以下情况时请停止使用本品，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

- (1)眼睛模糊的症状并无改善时
- (2)使用2天左右后症状并无好转时

### 4. 即使症状有所改善但使用期间超过2周时，请携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

## 功效

缓解花粉、屋尘（室内灰尘）等所造成的以下眼部过敏症状：眼睛发痒、眼睛充血、眼睛模糊（眼垢过多等）、流眼泪、有异物感（感觉眼中有东西在滚动）

## 用法及用量

每次 1 至 2 滴，1 天使用 4 至 6 次。

### 〈用法及用量相关注意事项〉

- (1)请严格遵守用法及用量。
- (2)儿童使用时，请在监护人指导与监督的情况下使用。
- (3)请不要让容器前端接触到眼皮与睫毛。  
请勿使用已经浑浊的眼药水。
- (4)请勿在佩戴隐形眼镜的情况下使用。
- (5)本品仅限用于滴眼。
- (6)本药剂为粘稠性药液，滴眼后，请注意视野会暂时模糊。

1. 使用前请先将手洗净。
2. 轻轻向下按压下眼皮，在眼球正上方滴 1 至 2 滴。  
请注意，不要让容器前端接触到眼皮与睫毛。
3. 滴完后，请闭上眼睛，让眼药水彻底滋润双眼。
4. 使用后，请确保容器前端与瓶盖清洁，并盖紧瓶盖。



## 成分及含量

本品为无色至浅黄色透明滴眼药剂，每 100mL 中含有以下成分。

成分	含量	作用
Sodium Cromoglicate	1 g	抑制过敏介质的释放， 缓解难耐过敏症状。
Chlorpheniramine Maleate	0.015 g	阻止引发过敏症状的组胺受体结合， 抑制眼部发痒。
Dipotassium Glycyrrhizinate	0.125 g	缓解过敏反应造成的眼部炎症。
Chondroitin Sulfate Sodium	0.2 g	保持眼睛滋润，呵护角膜表面。

添加剂：Edetate Sodium, Boric Acid, Sodium Borate, Benzalkonium Chloride, Propylene Glycol, Polysorbate 80, dl-Camphor, d-borneol, pH adjuster, Hypromellose, Sodium Hyaluronate

## 保管及使用上的注意事项

- (1)请密封保管于阳光直射不到的阴凉处。
- (2)请保管于儿童触及不到的地方。
- (3)请勿换装于其他容器。（可能导致误用或变质）
- (4)请勿与他人共用。
- (5)请勿使用已超过所标识的使用期限的产品。即使在使用期限内，开封后也请尽快使用。  
容器的使用期限标识（背面上段），按阳历年、月顺序表示。
- (6)请勿放置于汽车里或暖气附近等高温（40℃或以上）处。  
（会使容器变形）

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。  
第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室  
邮编103-8234 东京都中央区日本桥3-14-10  
电话号码：0120-337-336  
受理时间：9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®注册商标



生产销售商  
第一三共医药保健株式会社  
东京都中央区日本桥 3-14-10