

使用前請務必閱讀本說明書。  
同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時隨時取閱。

## 第 2 類醫藥品

舒緩花粉、室內灰塵等所引起之眼睛過敏症狀

# AG Allercut® im

含有色甘酸鈉之點眼藥

AG Allercut im 之特點

1. 抗過敏劑「色甘酸鈉」抑制過敏誘發物質的釋放，舒緩難耐之過敏症狀。
2. 「順丁烯二酸氯苯那敏鹽」阻礙引發過敏症狀之組織胺受體結合，抑制眼睛發癢。
3. 「甘草酸二鉀」抑制過敏反應之眼睛炎症。
4. 「硫酸軟骨素鈉」保持眼睛滋潤、呵護角膜表面。
5. 本品為稠性藥液。



### 使用上注意事項



**禁止事項** (若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用及事故)

1. 以下人群請勿使用。  
曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
2. 與點鼻藥並用時請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。  
(可能會引起嗜睡等症狀)



### 諮詢事項

1. 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
  - (1)正在接受醫師治療者
  - (2)正在接受脫敏療法等過敏治療者
  - (3)孕婦或有可能懷孕者
  - (4)曾對藥物等產生過敏症狀者
  - (5)有以下症狀者：眼部劇烈疼痛
  - (6)被診斷出患有以下疾病者：青光眼
  - (7)尚不清楚是否因過敏或其他原因所引起的症狀者  
特別是以下情形無法斷定為過敏所致，使用前請先向醫師諮詢。
    - 只有一只的眼睛出現症狀時
    - 只有眼睛出現症狀，鼻子並未出現症狀時
    - 視力也受到影響時

2. 使用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止使用本品，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹、疼痛

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 以下情形時請停止使用本品，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
  - (1)眼睛模糊未得到改善時
  - (2)使用2天左右後症狀並無改善時
4. 症狀有改善且使用時期超過2週時，請攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

## 功效

舒緩因花粉、室內灰塵等所造成的眼睛過敏症狀：眼睛發癢、眼睛充血、眼睛模糊（眼垢較多等）、流眼淚、眼內有異物感

## 用法及用量

1 次 1 至 2 滴，1 天點眼 4 至 6 次。

〈用法及用量相關之注意事項〉

- (1)請嚴格遵守用法及用量。
- (2)兒童使用時，請在監護人之指導監督下使用。
- (3)請勿讓容器前端碰觸至眼皮、睫毛。  
另外，請勿使用混濁的藥液。
- (4)請勿在佩戴隱形眼鏡之狀態下使用。
- (5)請僅限用於點眼。
- (6)本品為有稠度的藥液，點眼後，視野會暫時模糊，敬請注意。

1. 使用前請將手清洗乾淨。
2. 將下眼皮輕輕下拉，由正上方滴入 1 至 2 滴。  
此時，請注意不要讓容器前端直接接觸到眼皮、眼睫毛等。
3. 點眼後，閉上眼睛，讓藥水均勻擴散至眼睛四周。
4. 使用後請確保容器前端與蓋子的清潔，並將蓋子擰緊。



## 成分及含量

本品為無色至淺黃色透明點眼藥劑，每 100mL 中含有以下成分。

成分	含量	作用
Sodium Cromoglicate	1 g	抑制過敏誘發物質的釋放， 舒緩難耐過敏症狀。
Chlorpheniramine Maleate	0.015 g	阻礙引發過敏症狀之組織胺受體結合， 抑制眼睛發癢。
Dipotassium Glycyrrhizinate	0.125 g	抑制過敏反應造成的眼睛炎症。
Chondroitin Sulfate Sodium	0.2 g	滋潤眼睛，呵護角膜表面。

添加物：Edetate Sodium, Boric Acid, Sodium Borate, Benzalkonium Chloride, Propylene Glycol, Polysorbate 80, dl-Camphor, d-borneol, pH adjuster, Hypromellose, Sodium Hyaluronate

## 保管及使用上的注意事項

- (1)請密封保管於陽光直射不到的陰涼處。
- (2)請保管於兒童觸及不到的地方。
- (3)請不要移至其他容器。(會導致誤用或變質)
- (4)請勿與他人共用。
- (5)請勿使用已超過所標識之使用期限的產品。另外，即使在使用期限內，開封後，也盡量快速用完。  
容器標示之使用期限（背面上側），以陽曆年月所表示。
- (6)請勿放置於汽車裡或取暖設備附近等，高溫（40℃或以上）的場所。  
（易導致容器變形）

有關本品資訊，請向所採購之店鋪或以下窗口諮詢。  
第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口  
郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10  
電話號碼 0120-337-336  
受理時間 9:00 ~ 17:00 (週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®註冊商標



製造銷售商  
第一三共醫療保健株式會社  
東京都中央區日本橋 3-14-10