

使用前請務必閱讀本說明書。
同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時隨時取閱。

第2類醫藥品

舒緩花粉、室內粉塵等造成之鼻部過敏症狀

AG Allercut® S

添加有色甘酸鈉之點鼻藥

AG Allercut S 之特點

1. 抗過敏劑「色甘酸鈉」抑制過敏誘發物質的釋放，舒緩難耐之過敏症狀。
2. 「順丁烯二酸氯苯那敏鹽」阻礙引發過敏症狀之組織胺受體結合，抑制打噴嚏與鼻水。
3. 「鹽酸萘甲唑啉」，抑制鼻黏膜腫脹與充血，迅速改善鼻塞症狀。
4. 「甘草酸二鉀」抑制過敏反應引起的鼻部炎症。
5. 「氯化十六烷基吡啶水合物」透過殺菌作用抑制細菌繁殖，保持鼻腔內清潔。
6. 清爽使用感之點鼻藥劑。



使用上注意事項



禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用及事故)

1. 以下人群請勿使用。
曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
2. 使用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。
(可能會引起嗜睡等症狀)
3. 請勿長期連續使用。



諮詢事項

1. 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
 - (1)正在接受醫師治療者
 - (2)正在接受脫敏療法過敏治療者
 - (3)孕婦或有可能懷孕者
 - (4)曾對藥物等產生過敏症狀者
 - (5)被診斷出患有以下疾病者
高血壓、心臟病、糖尿病、甲狀腺功能障礙、青光眼
 - (6)尚不清楚是否因過敏或其他原因所引起的症狀者
2. 使用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止使用本品，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、紅腫
鼻部	腫脹、刺痛感、流鼻血
精神神經系統	頭痛

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 使用3天左右後症狀並無改善時，請停止使用本品，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
4. 症狀有改善時且使用時期超過2週時，請攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

功效

舒緩因花粉、室內灰塵等所造成的鼻部過敏症狀：
鼻水（鼻水過多）、鼻塞、打噴嚏、頭重（頭部感到沉重）

用法及用量

年齡	1次用量	1天使用次數
成人（15歲或以上）	向兩邊鼻腔內各噴霧1次。	3至5次 （請間隔3小時或以上後使用）
7歲或以上未滿15歲		
未滿7歲	請勿使用。	

〈用法及用量相關之注意事項〉

- (1)請嚴格遵守用法及用量。
- (2)使用過度反而會導致鼻塞。
- (3)7歲或以上兒童使用時，請在監護人指導監督下使用。
- (4)僅限用於點鼻。

1. 使用前請將鼻子擤乾淨。
(擤鼻子時不要用力過度)
2. 摘下藍色蓋子，如圖所示拿起容器。
(首次使用本品時，按壓數次排出空氣，直到藥液噴出為止)
3. 將噴頭前端輕輕放入鼻腔內，噴霧1次藥液。
請向另一側鼻腔進行同樣的操作。
4. 使用後請用乾淨的紙巾等擦拭噴頭，並蓋緊蓋子。



成分及含量

本品為無色至淺黃色透明液體，每 100mL 中含有以下成分。

成分	含量	作用
Sodium Cromoglicate	1 g	抑制過敏誘發物質的釋放， 舒緩難耐過敏症狀。
Chlorpheniramine Maleate	0.25 g	阻礙引發過敏症狀之組織胺受體結合， 抑制打噴嚏與鼻水。
Naphazoline Hydrochloride	0.025 g	抑制鼻黏膜腫脹與充血，迅速改善鼻塞。
Dipotassium Glycyrrhizinate	0.3 g	舒緩過敏反應造成之鼻部炎症。
Cetylpyridinium Chloride Hydrate	0.05 g	透過殺菌作用抑制細菌繁殖， 清潔鼻腔內側。

添加物：Edetate Sodium, Polysorbate 80, Glycerin

保管及使用上的注意事項

- (1)請蓋緊蓋子後保管於陽光直射不到的陰涼處。
- (2)請保管於兒童觸及不到的地方。
- (3)請不要移至其他容器。(會導致誤用或變質)
- (4)請勿與他人共用。
- (5)請勿使用已超過所標識之使用期限的產品。另外，即使在使用期限內，
開封後，也盡量快速用完。

有關本品資訊，請向所採購之店鋪或以下窗口諮詢。


第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10

電話號碼 0120-337-336 受理時間 9:00 ~ 17:00 (週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®註冊商標

 銷售商
第一三共醫療保健株式會社
Daiichi-Sankyo 東京都中央區日本橋 3-14-10

製造銷售商
Teika 製藥株式會社
富山市荒川 1-3-27