

*：2023年1月
(修改使用注意事項)

使用前請務必閱讀本說明書。
請妥善保管此說明書，以便在必要時取閱。

解熱鎮痛藥

第2類醫藥品

迅速發揮療效呵護胃部
頭痛、發燒、月經痛

CALONAL® A

CALONAL A 的特點

- 解熱鎮痛成分「乙醯胺酚」迅速作用於中樞神經，發揮良好之鎮痛、解熱療效。
- 對胃部負擔較小之解熱鎮痛藥。
- 不含嗜睡成分(鎮靜催眠成分)。
- 1次1錠發揮良好療效。



使用注意事項



禁止事項

(不遵守則會導致目前症狀惡化，或引發副作用)

1. 以下人群禁止服用本藥劑。
 - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - (2) 曾因服用本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥而引起過氣喘者
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下任何醫藥品。
其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥
3. 服用前後請勿飲酒。
4. 請勿長期連續服用。



諮詢事項

1. 以下人群請在服用前諮詢醫師、牙科醫師、藥師或登錄銷售者。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或可能懷孕的人
 - (3) 高齡者
 - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (5) 接受過下列診斷的人
心臟病、腎臟病、肝臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍

2. 服用後若觀察到以下症狀，表示可能發生副作用，請立即停止服藥，並攜帶此說明書諮詢醫師、藥師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
精神神經系統	頭暈
其他	體溫過度下降

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	服用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、咽喉疼痛、皮膚廣範圍發疹或發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒(小膿疱)、全身倦怠、沒有食慾等症狀持續，或者突然惡化。
* 藥物過敏症候群	出現皮膚大面積發紅、全身範圍發疹、發燒、體乏無力、淋巴結(脖子、腋下及大腿根部)腫脹等症狀。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等症狀。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等症狀。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體活動時，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者這些症狀持續。
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

3. 即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服藥，並攜帶此說明書，諮詢醫師、牙科醫師、藥師或登錄銷售者。

功效

- 頭痛、月經痛(生理痛)、牙痛、拔牙後的疼痛、咽喉疼痛、腰痛、關節痛、神經痛、肌肉痛、肩膀痠痛、耳痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、外傷痛的鎮痛
- 惡寒、發燒時的解熱

用法與用量

請以下列用量配冷水或溫水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人(15歲或以上)	1錠 	最多3次。 請盡量避免空腹時服用。 請確保4小時或以上的服藥間隔。
未滿15歲	請勿服用。	

〈用法與用量的相關注意事項〉

- 請嚴格遵守用法與用量。
- 錠劑的取出方式
如右圖所示，以指尖用力擠壓內含錠劑的 PTP 包裝，使背面的鋁箔破裂後即可取出服用。(若錯誤取用並直接吞食其 PTP 包裝，可能造成食道黏膜穿刺等意外事故。)



成分與含量

本劑為白色錠劑，每1錠中含有以下成分。

成分	分量	作用
Acetaminophen	300 mg	作用於中樞神經，退燒、舒緩疼痛。

添加劑：Cellulose, Partly Pregelatinized Starch, Partially Hydrolyzed Polyvinyl Alcohol, Magnesium Stearate, l-Menthol, Fragrance, Lactose

保管及使用上的注意事項

- 請避免陽光直射，保管在潮氣小的陰涼處。
- 請保管在兒童無法觸及的地方。
- 請不要移至其他容器中(易導致誤用或變質)。
- 請勿使用超過所標示的使用期限之產品。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00~17:00(週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

02®註冊商標



生產銷售商
第一三共醫療保健株式會社
東京都中央區日本橋 3-14-10