

使用前請務必閱讀本說明書。
同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時取閱。

胃腸藥

第2類醫藥品 針對腹脹、反胃、胃部不適感 快速舒緩

第一三共胃腸藥錠劑s

第一三共胃腸藥 藥錠 s

第一三共胃腸藥藥錠 s 的特點

本藥劑擁有以下作用，可用於舒緩腹脹、反胃、胃部不適感等症狀。

- 脂肪酶"Lipase AP12"與消化酶"Taka-Diastase N1"有助消化。
- 6種健胃成分作用於虛弱的胃部，有效針對胃部不適、食慾不振等症狀。
- 生藥野梧桐、甘草末修復胃黏膜不適、潰爛，3種制酸劑中和胃酸，抑制胃痛原因。
- 不含鈉成分，介意攝取鹽分的人群亦可服用。



使用上注意事項

禁止事項

- (若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用)
1. 以下人群請勿服用。
正在接受透析療法者
 2. 請勿長期連續服用。



諮詢事項

1. 以下人群請在服用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 曾對藥物等產生過敏症狀者
 - (3) 被診斷出患有以下疾病者
腎臟病
2. 服用後若出現以下症狀時，有可能為副作用，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢

3. 服用後，可能會出現下列症狀，此症狀持續或加重時請停止服用本劑，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

便秘、腹瀉

4. 服用2週左右後症狀無改善時，請停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

功效

- 腹脹、進食過量、飲酒過量、胸悶、食慾不振
- 胸口灼熱、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不適、打嗝
- 消化不良、促進消化、胃弱、胃部及腹部有膨脹感
- 噁心(反胃、宿醉、酪酊大醉導致之嘔吐感、噁心)、嘔吐



腹脹



反胃



胃部不適



胃痛

用法·用量

請依照下述用量，用冷水或溫水送服。

年齡	1次用量	1天服用次數
15歲或以上	3錠	3次 請在餐後服用。
11歲或以上未滿15歲	2錠	
未滿11歲	請勿服用。	

〈用法及用量的相關注意事項〉

- (1) 請嚴格遵守用法用量。
- (2) 11歲或以上兒童服用時，請在家長或監護人指導監督下服用。

成分・分量

本劑為淡灰褐色或淡褐色裸錠，每 9 錠中含有以下成分。

成分	分量	作用
Taka-Diastase N1	150mg	pH 值適用範圍較廣的消化酶，幫助消化，促進營養吸收。
Lipase AP12	60mg	脂肪酶，具有消化作用。
Mallotus bark extract	63mg (按野梧桐計算為 504mg)	抑制腸胃過度緊張，保護胃黏膜，舒緩胃部炎症。
Powdered glycyrrhiza	150mg	
Magnesium Aluminosilicate	720mg	持續保持制酸作用及保護胃黏膜炎症部分。且碳酸氫氧鎂鋁水合物 (Synthetic hydrotalcite) 還具有速效性。
Synthetic hydrotalcite	300mg	
Magnesium hydroxide	600mg	擁有速效制酸作用，舒緩燒心、打嗝等胃酸過多導致的症狀。
Powdered phellodendron bark	105mg	以味道與氣味刺激味覺，調整胃液與消化液之分泌，促進消化。
Powdered cinnamon bark	225mg	
Powdered fennel	60mg	
Powdered clove	30mg	
Powdered ginger	75mg	
l-Menthol	9mg	

添加物：zanthoxylum fruit, potato starch, carmellose, magnesium stearate

保管及使用上的注意事項

- (1) 請避免陽光直射，密封保管在潮氣小的陰涼處。
- (2) 請保管在兒童無法觸及的地方。
- (3) 請不要移至其他容器中 (會導致誤用或變質)。
- (4) 請勿用濕漉的手拿取藥劑。水分可能導致藥錠表面部分融化、變色或顏色不均。若將附有水分的藥錠放回藥瓶中，將影響其他錠劑之品質，因此請不要將濕漉的錠劑放回藥瓶。
- (5) 藥瓶填充物是為防止運輸過程中錠劑破損，請在開封後將其丟棄。
- (6) 請勿使用已超過所標示使用期限之產品。請在打開藥瓶後 12 個月以內使用。
- (7) 請在包裝盒的「開封年月日」記錄欄中，填寫打開藥瓶的日期。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00 ~ 17:00 (週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisanryo-hc.co.jp/>



生產銷售商
第一三共醫療保健株式會社
東京都中央區日本橋 3-14-10