

使用前请务必阅读本说明书。
同时应对此说明书进行妥善保管，以方便在必要时取阅。

针对胃痛、胃胀等胃部不适症状

H₂受体阻断肠胃药

ガスター10

日本药典 法莫替丁片剂 Gaster 10

第 1 类医药品

- 若服用 3 天后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。
- 请勿持续服用超过 2 周。
- (有容易忽视消化系统重症的可能，请就医接受医师诊疗)



Gaster 10 的特点

- 本肠胃药不属于胃酸中和剂，针对胃痛、胃胀发挥良好效果。
- 控制造成胃部不适症状的原因--胃酸过多，促进修复胃黏膜。
- PTP 泡罩包装携带方便。

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现不良反应)

- 下述人群请勿服用。
 - 曾因内含法莫替丁等的 H₂ 受体阻断药物产生过敏症状的人群 (例如：起疹，发红，发痒，及喉咙、眼睑、嘴唇等部位肿胀)
 - 正在医疗机构接受以下治疗或使用以下药品的人群。
血液疾病、肾脏或肝脏疾病、心脏疾病、胃或十二指肠的疾病、哮喘或风湿等免疫系统的疾病、类固醇药物、抗生素、抗癌剂、唑类抗真菌剂
(有可能会引起白细胞减少、血小板减少等症状)
(患有肾脏或肝脏疾病的患者，有可能会引起药物排泄延迟使药物作用增强)
(患有心肌梗塞、瓣膜病、心肌病等心脏疾病的患者，有可能会引起心电图异常的脉搏紊乱)
(正在接受胃或十二指肠疾病治疗的患者，很有可能正在服用法莫替丁或类似的处方药，请避免重复服用)
(会降低唑类抗真菌剂的吸收并减弱其疗效)
 - 曾被医师诊断为红细胞计数偏少 (贫血)、血小板计数偏少 (不易止血、易出血)、白细胞计数偏少等血液异常的人群
(有可能因本品而再次引发血液异常)
 - 儿童 (未满 15 岁) 以及老年人 (80 岁或以上)
 - 孕妇或有其可能性的人群
- 在服用本品期间，不要服用下述医药品。
其他肠胃药
- 处于哺乳期时不要服用本品，或在服用本品时不要进行哺乳。

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师或药剂师。
 - 正在接受医师治疗或正在服用其他药品的人群
 - 曾因药物等出现过过敏症状的人群
 - 高龄者 (65 岁或以上)
(通常老年人的生理机能处于衰退状态)
 - 拥有以下症状的人群
咽喉疼痛、咳嗽及高烧 (有这些症状的人群疑似患有重症感染性疾病，有可能出现血细胞计数减少等血液异常。若在服用前有这些症状，服用本品有可能会引起病症恶化，从而出现无法及时发现本品不良反应的情况)、不明原因的体重降低、持续性腹痛 (该症状有可能因其他疾病所导致)

2. 服用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒、肿胀
循环系统	脉搏紊乱
精神神经系统	感觉晕沉、惊厥（痉挛）
其他	感觉不适、乏力、发烧咽喉疼痛等身体异常。

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症状
休克（过敏性）	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。
横纹肌溶解症	出现手脚、肩、腰等肌肉疼痛、手脚发麻、使不上力、僵硬、全身无力、红褐色尿等症状。
肝功能障碍	出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
肾损伤	出现发烧、起疹、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
间质性肺炎	上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧等症状，并且此类症状突然出现或长时间持续。
血液障碍	咽喉疼痛、发烧、全身无力、脸部及眼皮后泛白、容易出血（牙龈出血、流鼻血等），出现淤青（按压后也不会消失）等症状。

3. 不慎服用过量药剂时，应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。

4. 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。
便秘、软便、腹泻、口干

功能主治

胃痛、胃胀、烧心、呕吐感（本品含有 H₂ 受体阻断药）

<功能主治相关注意>

请勿将本品用于功能主治所标注以外的症状。

用法及用量

若出现胃痛、胃胀、烧心、呕吐感等症状，请按照以下用量，用凉水或温水送服。

年龄	1次用量	1天服用次数
成年人（15岁或以上，未满80岁）	1片	2次为止
儿童（未满15岁）		请勿服用。
高龄者（80岁或以上）		请勿服用。

- 若服用 8 小时以后症状仍未改善，请再服用 1 片。
- 若症状得到控制，请停止服用。
- 若服用 3 天后症状仍无改善，则应中止服用，并向医师或药剂师咨询。
- 请勿持续服用超过 2 周。

<用法及用量相关注意>

(1) 请严格遵守用法及用量。

(2) 服用本品时，请避免摄取酒精饮料。（通常不建议同时服用药物与酒精饮料）

[片剂取出方法]

如右图所示，用手指尖用力按压铝箔泡罩包装突起部，片剂会刺破铝箔，并将其取出后服用。

（若不慎连同包装一起误服，恐将导致刺伤食道黏膜等意外事故）



成分及含量

本品为糖衣片，每 1 片中含以下成分。

成分	含量	作用
Famotidine	10 mg	可抑制胃酸分泌过剩。

添加剂：Dibasic Calcium Phosphate Hydrate, Cellulose, Lactose, Hydroxypropylcellulose, Corn Starch, Silicic Anhydride, Calcium Stearate, White soft Sugar, Calcium Lactate, Macrogol, Titanium Oxide, Talc, Carnauba Wax

保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射，保管在潮气小的阴凉处。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- (4) 请勿使用超过标注使用期限的产品。

本药无需按照固定的时间段服用，请在出现症状时服用。

本药不受就餐的影响，可在餐前、餐后或两餐之间服用。

1 次服用 1 片可抑制胃酸分泌过剩达 8 小时，如果 1 天服用 2 次，请间隔 8 小时或以上再次服用。

为了肠胃的健康

暴饮暴食、过度摄取嗜好品、不按时就餐等，有害肠胃健康。请避免这样的饮食生活习惯。此外，请定期接受体检。

有关本产品信息，请咨询购买其的药局或以下联系窗口。

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10

电话号码 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00 (周六、周日及节假日休息)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



生产销售商

第一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥3-14-10

中文（简体字） 2024.10 制作

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。