

使用前請務必閱讀本說明書。  
同時應對此說明書進行妥善保管，以方便在必要時取閱。

針對胃痛、腹脹等胃部不適症狀

H<sub>2</sub> 受體拮抗胃腸藥

# ガスター10

日本藥典 呋莫替定錠 Gaster 10

第 1 類醫藥品



- 服用 3 天后症狀無改善時，請停止服用本劑，並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。
  - 請勿持續服用超過 2 週。
- (有容易忽視消化系統重症之可能，請就醫接受醫師診療)

## Gaster 10 的特點

- 本胃腸藥不屬於胃酸中和劑，針對胃痛、腹脹發揮良好效果。
- 控制造成胃部不適症狀原因之胃酸過多，促進修復胃黏膜。
- PTP 包裝便於攜帶。

## 使用上注意事項

### 禁止事項

(若不遵守則會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用)

- 下述人群請勿服用。
  - 曾因內含呋莫替定等的 H<sub>2</sub> 受體拮抗藥物產生過敏症狀者(例如：發疹、發紅、發癢，及喉嚨、眼瞼、嘴唇等部位腫脹)
  - 正在醫療機構接受以下治療或使用以下藥品者。  
血液疾病、腎臟或肝臟疾病、心臟疾病、胃或十二指腸之疾病、哮喘或風濕等免疫系統之疾病、類固醇藥物、抗生素、抗癌劑、唑類抗真菌劑  
(有可能會引起白血球減少、血小板減少等症狀)  
(患有腎臟或肝臟疾病之患者，有可能會導致藥物排泄延遲使藥物作用增強)  
(患有心肌梗塞、瓣膜病、心肌病等心臟疾病之患者，有可能會出現伴隨心電圖異常之脈搏紊亂)  
(正在接受胃或十二指腸疾病治療之患者，很有可能正在服用呋莫替定或類似之處方藥，請避免重複服用)  
(會降低唑類抗真菌劑的吸收並減弱其療效)
  - 曾被醫師診斷為紅血球計數偏少(貧血)、血小板計數偏少(不易止血、易出血)、白血球計數偏少等血液異常者  
(有可能因本劑而再次引發血液異常)
  - 兒童(未滿 15 歲)以及老年人(80 歲或以上)
  - 孕婦或有其可能性的人群
- 服用本劑期間，請勿服用以下醫藥品。  
其他胃腸藥
- 處於哺乳期時不要服用本劑，或在服用本劑時不要進行哺乳。

### 諮詢事項

- 下述人群請在服用前諮詢醫師或藥劑師。
  - 正在接受醫師治療或正在服用其他藥品者
  - 曾對藥物等產生過敏症狀者
  - 高齡者(80 歲或以上)  
(通常老年人的生理機能處於衰退狀態)
  - 擁有以下症狀者  
咽喉疼痛、咳嗽及發燒 (有此類症狀者疑似患有重症感染性疾病，有可能出現血球計數減少等血液異常。若在服用前有這些症狀，服用本劑有可能會導致病症惡化，從而出現無法及時發現本劑副作用之情況)、不明原因之體重下降、持續性腹痛(該症狀有可能因其他疾病所導致)
- 服用後若出現下述症狀，則可能產生副作用，此時應立即中止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、腫脹

循環器官	脈搏紊亂
精神神經系統	感覺暈沉、驚厥(痙攣)
其他	感覺不適、乏力、發燒咽喉疼痛等身體異常。

偶爾會出現下述重症。此時請立即就醫。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	服用後立即出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、氣悶、心悸、意識不清等症狀。
史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症	高燒、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜爛、咽喉疼痛、皮膚大範圍發疹、發紅等症狀持續或急劇惡化。
橫紋肌溶解症	出現手腳、肩、腰等肌肉疼痛、手腳發麻、用不上力、僵硬、全身倦怠、紅褐色尿等症狀。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚或眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等症狀。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等症狀。
間質性肺炎	爬樓梯或因勞累而出現氣短、氣悶、空咳嗽、發燒等症狀，並且此類症狀突然出現或長時間持續。
血液障礙	咽喉疼痛、發燒、全身倦怠、臉部及眼皮內側泛白、容易出血(牙齦出血、流鼻血等)、出現瘀青(按壓後也不會消失)等症狀。

- 不慎服用過量藥劑時，應立即中止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。
- 服用後若出現下述症狀，若症狀持續或加重時應中止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。  
便秘、軟便、腹瀉、口乾

### 功效

胃痛、腹脹、胸口灼熱、嘔吐感 (本劑含有 H<sub>2</sub> 受體拮抗藥)

< 功效的相關注意事項 >

請勿將本劑用於功效所標注以外的症狀。

### 用法・用量

若出現胃痛、腹脹、胸口灼熱、嘔吐感等症狀，請依照下述用量，用冷水或溫水送服。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人(15歲或以上，未滿80歲)	1錠	2次為止
兒童(未滿15歲)	請勿服用。	
高齡者(80歲或以上)	請勿服用。	

- 服用 8 小時後症狀無改善時，請再服用 1 錠。
- 若症狀得到控制，請停止服用。
- 服用 3 天後症狀無改善時，請停止服用本劑，並向醫師或藥劑師諮詢。
- 請勿持續服用超過 2 週。

< 用法及用量的相關注意事項 >

(1) 請嚴格遵守用法用量。

(2) 服用本劑時，請避免攝取酒精飲料。(通常不建議同時服用藥物與酒精飲料)

[藥錠取出方法]

如右圖所示，用手指尖用力按壓鋁箔泡罩包裝突起部，藥錠會刺破鋁箔，並將其取出後服用。

(若不慎連同包裝一起誤服，恐將導致刺傷食道黏膜等意外事故)



### 成分・含量

本劑為糖衣錠，每 1 錠中含有以下成分。

成分	含量	作用
Famotidine	10 mg	可抑制胃酸分泌過剩。

添加物：Dibasic Calcium Phosphate Hydrate, Cellulose, Lactose, Hydroxypropylcellulose, Corn Starch, Silicic Anhydride, Calcium Stearate, White soft Sugar, Calcium Lactate, Macrogol, Titanium Oxide, Talc, Carnuba Wax

## 保管及使用上的注意事項

- (1) 請避免陽光直射，密封保管在潮氣小的陰涼處。
- (2) 請保管在兒童無法觸及的地方。
- (3) 請不要移至其他容器中。(會導致誤用或變質)
- (4) 請勿使用已超過所標示使用期限之產品。

本藥無需按照固定時間段服用，請在出現症狀時服用。

本藥不受就餐之影響，可在餐前、餐後或兩餐之間服用。

1 次服用 1 錠可抑制胃酸分泌過剩達 8 小時，如果 1 天服用 2 次，請間隔 8 小時或以上再次服用。

### 為了您腸胃健康

暴飲暴食、過度攝取嗜好品、不按時就餐等，有損腸胃健康。請避免此類飲食生活習慣。  
此外，請定期接受健康檢查。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

**第一三共醫藥保健株式會社 顧客諮詢窗口**

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00 ~ 17:00(週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



生產銷售商

**第一三共醫藥保健株式會社**

東京都中央區日本橋3-14-10

中文(繁體字) 2024.10 製作

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。