

使用前请务必阅读本说明书。  
同时应对此说明书进行妥善保管，以方便在必要时取阅。

## H<sub>2</sub>受体阻断肠胃药

针对胃酸倒流所引起的烧心症状 迅速溶解起效的散剂

# ガスター10 <散> リバースコントロール

Gaster 10<散剂> 控制反酸

日本药典 法莫替丁散剂 Gaster 10<散剂>

第1类医药品

- 若服用3天后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。
- 请勿持续服用超过2周。  
(有容易忽视消化系统重症的可能，请就医接受医师诊疗)



## Gaster 10<散剂>的特点

- 本肠胃药不属于胃酸中和剂，可控制胃酸过多分泌，针对胃酸倒流等引起的烧心症状发挥良好效果。
- 无论睡觉前或空腹时，在出现烧心、胃痛、呕吐感等症状时，随时可以服用。
- 便携式分包装。

## 使用注意事项

### 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现不良反应)

- 下述人群请勿服用。
  - 曾因内含法莫替丁等的H<sub>2</sub>受体阻断药物产生过敏症状的人群(例如：起疹，发红，发痒，及喉咙、眼睑、嘴唇等部位肿胀)
  - 正在医疗机构接受以下治疗或使用以下药品的人群。  
血液疾病、肾脏或肝脏疾病、心脏疾病、胃或十二指肠的疾病、哮喘或风湿等免疫系统的疾病、类固醇药物、抗生素、抗癌剂、唑类抗真菌剂  
(有可能会引起白细胞减少、血小板减少等症状)  
(患有肾脏或肝脏疾病的患者，有可能会使药物排泄延迟使药物作用增强)  
(患有心肌梗塞、瓣膜病、心肌病等心脏疾病的患者，有可能会使心电图异常的脉搏紊乱)  
(正在接受胃或十二指肠疾病治疗的患者，很有可能正在服用法莫替丁或类似的处方药，请避免重复服用)  
(会降低唑类抗真菌剂的吸收并减弱其疗效)
  - 曾被医师诊断为红细胞计数偏少(贫血)、血小板计数偏少(不易止血、易出血)、白细胞计数偏少等血液异常的人群  
(有可能因本品而再次引发血液异常)
  - 儿童(未满15岁)以及老年人(80岁或以上)
  - 孕妇或有其可能性的人群
- 在服用本品期间，不要服用下述医药品。  
其他肠胃药
- 处于哺乳期时不要服用本品，或在服用本品时不要进行哺乳。

### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师或药剂师。
  - 正在接受医师治疗或正在服用其他药品的人群
  - 曾因药物等出现过敏症状的人群
  - 高龄者(65岁或以上)  
(通常老年人的生理机能处于衰退状态)
  - 拥有以下症状的人群  
咽喉疼痛、咳嗽及高烧(有这些症状的人群疑似患有重症感染性疾病，有可能出现血细胞计数减少等血液异常。若在服用前有这些症状，服用本品有可能会使病症恶化，从而出现无法及时发现本品不良反应的情况)、不明原因的体重降低、持续性腹痛(该症状有可能因其他疾病所导致)
- 服用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒、肿胀
循环系统	脉搏紊乱

精神神经系统	感觉晕沉、惊厥（痉挛）
其他	感觉不适、乏力、发烧咽喉疼痛等身体异常。

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症状
休克（过敏性）	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。
横纹肌溶解症	出现手脚、肩、腰等肌肉疼痛、手脚发麻、使不上力、僵硬、全身无力、红褐色尿等症状。
肝功能障碍	出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
肾损伤	出现发烧、起疹、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
间质性肺炎	上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧等症状，并且此类症状突然出现或长时间持续。
血液障碍	咽喉疼痛、发烧、全身无力、脸部及眼皮后泛白、容易出血（牙龈出血、流鼻血等），出现淤青（按压后也不会消失）等症状。

- 不慎服用过量药剂时，应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。  
便秘、软便、腹泻、口干

### 功能主治

烧心、胃痛、呕吐感、胃胀（本品含有 H<sub>2</sub> 受体阻断药）

<功能主治相关注意>

请勿将本品用于功能主治所标注以外的症状。

### 用法及用量

若出现烧心、胃痛、呕吐感、胃胀等症状，请按照以下用量，用凉水或温水送服。

年龄	1次用量	1天服用次数
成年人（15岁或以上，未满80岁）	1包	2次为止
儿童（未满15岁）	请勿服用。	
高龄者（80岁或以上）	请勿服用。	

- 若服用 8 小时以后症状仍未改善，请再服用 1 包。
- 若症状得到控制，请停止服用。
- 若服用 3 天后症状仍无改善，则应中止服用，并向医师或药剂师咨询。
- 请勿持续服用超过 2 周。

<用法及用量相关注意>

- (1) 请严格遵守用法与用量。
- (2) 服用本品时，请避免摄取酒精饮料。（通常不建议同时服用药物与酒精饮料）

### 成分及含量

本品为散剂，每 1 包（0.5 g）中含有以下成分。

成分	含量	作用
Famotidine	10 mg	可抑制胃酸分泌过剩。

添加剂：D-Sorbitol, Hydroxypropylcellulose, l-Menthol, Silicic Anhydride

## 保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射，保管在潮气小的阴凉处。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- (4) 请勿使用超过标注使用期限的产品。

本药无需按照固定的时间段服用，请在出现症状时服用。

本药不受就餐的影响，可在餐前、餐后或两餐之间服用。

1次服用1包可抑制胃酸分泌过剩达8小时，如果1天服用2次，请间隔8小时或以上再次服用。

### 为了肠胃的健康

暴饮暴食、过度摄取嗜好品、不按时就餐等，有害肠胃健康。请避免这样的饮食生活习惯。此外，请定期接受体检。

有关本产品信息，请咨询购买其的药局或以下联系窗口。

**第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室**

邮编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10

电话号码 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00 (周六、周日及节假日休息)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



生产销售商

**第一三共医药保健株式会社**

东京都中央区日本桥3-14-10