

面向使用者的资料

使用前请务必阅读本说明书。

ロキソニン 総合かぜ薬
LOXONIN® 综合感冒药

要指导医药品

使用者医药品说明书

本品是含有洛索洛芬钠水合物的综合感冒药。

○**预产期在 12 周以内的孕妇请勿服用。**

○**服用 5 天后，症状仍无改善时，请停止服用，并接受医师诊疗。**

请仔细阅读以下说明后，遵守用法及用量服用。

本药剂是什么？

产品名称	LOXONIN 综合感冒药
有效成分名 与含量 (1 日量 6 片中)	洛索洛芬钠水合物..... 204.3mg (按无水物计算为 180mg)
	磷酸双氢可待因..... 24mg
	消旋盐酸甲基麻黄碱..... 60mg
	盐酸溴己新..... 12mg
	富马酸氯马斯汀..... 1.34mg

本药剂有什么效果？

○本药剂含有属于非甾体类消炎镇痛药品 (NSAIDs) 类群的解热镇痛成分洛索洛芬钠水合物、镇咳成分磷酸双氢可待因与消旋盐酸甲基麻黄碱，祛痰成分盐酸溴己新，抑制鼻涕、鼻塞成分富马酸氯马斯汀均作为有效成分，是有效缓解感冒各种症状的综合感冒药。

○可以根据下列目的服用本药剂。

缓解各种感冒症状 (鼻涕、鼻塞、打喷嚏、咽喉痛、咳嗽、有痰、恶寒、发烧、头痛、关节痛、肌肉痛)

服用本药剂之前需确认什么？① 要点

请参照以下项目，确认是否可以服用本药剂。

副作用 (因药剂引起的有害反应)，有研究表明有可能会诱发胃溃疡、十二指肠溃疡、重度气喘的发作，引起皮疹、浮肿等。详见【服用本药剂期间需注意什么？】。

下述人群请勿服用本药剂。

□曾因本剂或本剂所含成分而引发过过敏症状者

□曾因服用本剂或其他感冒药、解热镇痛药而引起过气喘者

【曾服用含有洛索洛芬钠水合物、阿司匹林 (乙酰水杨酸)、乙酰水杨酸铝、乙氧基苯酰胺、异布洛芬、乙酰胺酚以及异丙基安替比林配方的感冒药及解热镇痛药而引起过哮喘者】

□未满 15 岁的儿童

□在医疗机构接受以下治疗者

●胃溃疡、十二指肠溃疡 ●肝脏病 ●肾脏病 ●心脏病

□曾被医师告知患有以下血液异常 (血液疾患) 者

●红血球数偏少 (贫血)

●血小板数偏少 (不容易止血、容易出血)

●白血球数偏少

□**预产期在 12 周以内的孕妇**

服用本药剂之前需确认什么？②

下述人群在服用本药剂时需注意。

服用前请咨询医师或药剂师。

□正在接受医师或牙科医师治疗者

□孕妇 (不包括预产期在 12 周以内的孕妇) 或有可能怀孕者

□高龄者 (65 岁或以上)

□曾对药物等产生过过敏症状者

□患有以下症状者

高烧、排尿困难

□被诊断出患有以下疾病者

●甲状腺功能紊乱 ●糖尿病 ●心脏病 ●高血压 ●青光眼

●支气管哮喘 ●溃疡性大肠炎 ●克罗恩氏病


●系统性红斑狼疮 ●混合型结缔组织疾病

●呼吸功能障碍 ●阻塞性睡眠呼吸暂停综合征 ●肥胖症

□曾患有以下疾病者

●胃溃疡、十二指肠溃疡 ●肝脏病 ●肾脏病 ●血液疾患

购买本药剂之前需确认什么？

○**请勿连续服用超过 5 天。**  要点

服用 5 天后，症状仍无改善时，请停止服用，并接受医师诊疗。

○服用本品期间，请不要使用其他任何感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含有抗组胺药的内服药等 (鼻炎用内服药、晕车药、过敏药等)。

【解热镇痛成分 [Aspirin (Acetylsalicylic Acid), Aspirin Aluminum, Ethenzamide, Ibuprofen, Acetaminophen and Isopropylantipyrene]、镇静成分 [Allylisopropylacetylurea, Bromovalerylurea]、镇咳成分 [Tipepidine Citrate, Cloperastine Hydrochloride, Cloperastine Fendizoate, Codeine Phosphate Hydrate, Tipepidine Hibenzone, Dextromethorphan Hydrobromide Hydrate, Dextromethorphan Phenolphthalinate, Pentoxyverine Citrate, Noscaphine, Noscaphine Hydrochloride Hydrate]、祛痰成分 [Guaifenesin, Potassium Guaiaacolsulfonate, Potassium Cresolsulphonate]、抗组胺成分 [Chlorpheniramine Maleate, d-Chlorpheniramine Maleate, Diphenylpyraline Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride, Diphenhydramine Salicylate, Triprolidine Hydrochloride Hydrate, Promethazine Methylenedisalicylate, Carbinoxamine Maleate, Mequitazine] 等含有以上成分的其他医药品】

○服用后，请勿驾驶操作交通工具或机械类。

(可能出现嗜睡等情况。)

○哺乳期妇女请勿服用本药剂，若服用本药剂请勿哺乳。

○服用前后请勿饮酒。

如何使用本药剂？

○服用量及服用次数

请依照下述用量与次数服用。※服用前请务必阅读附属在内的说明书，并遵守用法用量正确使用。

请依照下述用量用凉水或温水服用。

年龄	1 次用量	1 天服用次数
成人 (15 岁或以上)	2 片	3 次 请尽量在饭后半小时内服用。
未满 15 岁	请勿服用。	

○服用 5 至 6 次后症状并无改善时，有可能患有其他疾患或并发症，此时请停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师或药剂师。

(特别是发烧持续 3 天或以上，或反复发烧时)

○如何服用？

请用 1 杯白水或温水送服。

○服用量过多时 (过量摄取时) 的因应方式

误将药剂过量服用时，请咨询医师或药剂师。

服用本药剂期间需注意什么？

○服用后可能会出现体温过度下降、虚脱（乏力）、四肢冰冷（手脚冰冷）等症状。出现此类症状时，请立即停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师或药剂师。



○服药后若出现消化性溃疡（腹胀、胸口灼热、后背疼痛）、浮肿等情形，请立即停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师或药剂师。另外，偶尔会发生消化道出血（出现吐血、恶心及呕吐、腹痛、黑色粘稠的粪便、血便等症状）、消化道穿孔（消化道开裂。出现恶心及呕吐、剧烈腹痛等症状）、小肠及大肠狭窄、梗阻（出现恶心及呕吐、腹痛、腹部膨胀等症状）等严重症状。该情况下，请立刻接受医师诊疗。

服用本药剂期间需注意什么？

(1)服用后出现以下症状时可能为副作用。此情形时，请立即停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师或药剂师。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒
消化器官	腹痛、胃部不适感、食欲不振、恶心及呕吐、腹部膨胀、胸口灼热、口腔溃疡、消化不良
循环器官	血压上升、心悸
精神神经系统	发麻、头晕、头痛、亢奋、痉挛
泌尿系统	排尿困难、血尿
其他	胸痛、倦怠感、脸部发烫、发烧、贫血

(2)偶尔会发生特别需要注意的副作用，这里记载有各主要自觉症状。副作用的情况，各副作用所记载的主要自觉症状中，数个症状同时出现的情况较为常见。此情况时，请立即停止服用本剂，接受医师诊疗。

症状名称	症状
休克（过敏性）	服用后马上出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。
血液障碍	出现咽喉疼痛、发烧、全身倦怠、脸部及眼皮内侧泛白、易出血（牙龈出血、鼻血等）、淤青（按压后也不会褪色）等症状。
史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松懈症、多形性红斑、急性泛发性发疹性脓疱病	发高烧、眼睛充血、眼屎、嘴唇溃烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹或发红、水泡出现在皮肤的红色部位、发红的皮肤上出现小疙瘩（小脓包）、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。
肾功能障碍	出现发烧、发疹、尿量减少、全身浮肿、全身倦怠、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
郁血性心脏衰竭	出现全身倦怠、心悸、气短、胸部不适感、胸痛、头晕、昏厥等症状。
心肌梗塞	胸部绞痛、呼吸困难、冒冷汗。
脑血管障碍	突然出现意识减退及丧失，单侧手脚不易动弹、头痛、呕吐、头晕、口齿不清、说话困难等症状
间质性肺炎	爬楼梯或活动稍微过量时，就会突然出现气短、呼吸困难、干咳、发烧等，或者这些症状持续。

症状名称	症状
肝功能障碍	出现发烧、发痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等症状。
横纹肌溶解症	手脚、肩膀、腰等的肌肉疼痛、手脚酸麻、无力、僵硬、全身倦怠、红褐色尿等。
无菌性脑膜炎	出现伴随脖子抽筋的剧烈头痛、发烧、恶心、呕吐等。（尤其在接受系统性红斑狼疮或混合型结缔组织疾病治疗者当中，通报有多数此类症状。）
哮喘	呼吸时发出呼呼声、咻咻声，出现呼吸困难等。
呼吸抑制	出现气短、呼吸困难等症状。

(3)服用本剂后，可能会出现下述症状，如果此类症状持续发生或有加重趋势的情况，请停止服用，并携带本药说明书咨询医师或药剂师。
口干、便秘、腹泻、嗜睡

本药剂中含有什么成分？

产品名称	LOXONIN 综合感冒药
有效成分名与含量 (1日量6片中)	Loxoprofen sodium hydrate 204.3mg (按无水物计算为 180mg)
	Dihydrocodeine phosphate 24mg
	dl-Methylephedrine hydrochloride 60mg
	Bromhexine hydrochloride 12mg
	Clemastine fumarate 1.34mg
添加剂	D-Mannitol, Cellulose, Hydroxypropylcellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium oxide, Talc, Carnauba Wax

其他

- 如何保管本药剂？
 - 请保管于阳光直射不到（湿气少）的阴凉处。
 - 请保管于儿童触及不到的地方。
 - 请勿换装于其他容器（可能导致误用或变质）。
- 请勿使用超过所标示的使用期限的产品。

有关本药剂的咨询窗口在哪里？

○有关常见疑问，请向下述窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社

(<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>)

顾客咨询室

邮编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10

电话号码 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

○有关症状、使用方法、副作用等更加详细疑问，请咨询医师或药剂师。



生产销售商

第一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥 3-14-10