

## 面向使用者之資料

使用前請務必閱讀本說明書。

# ロキソニン® 総合かぜ薬

LOXONIN® 綜合感冒藥

要指導醫藥品

使用者醫藥品指南

本品為含有洛索洛芬鈉水合物之綜合感冒藥。

○預產期在 12 週或以內的孕婦請勿服用。

○即使服用 5 天后，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，接受醫師診療。

請仔細閱讀以下說明後，遵守用法與用量服用。

## 本药剂是什么？

銷售名稱	LOXONIN 綜合感冒藥
有效成分名、含量 (1 日量 6 錠中)	洛索洛芬鈉水合物..... 204.3mg (按無水物計算為 180 mg)
	磷酸二氫可待因..... 24mg
	消旋鹽酸甲基麻黃鹼..... 60mg
	布朗信鹽酸鹽..... 12mg
	延胡索酸可利汀..... 1.34mg

## 本藥劑有什麼效果？

○本藥劑含有屬於非類固醇消炎止痛藥品 (NSAIDs) 之解熱鎮痛成分洛索洛芬鈉水合物，鎮咳成分磷酸二氫可待因與消旋鹽酸甲基麻黃鹼，祛痰成分布朗信鹽酸鹽，抑制鼻涕、鼻塞成分延胡索酸可利汀作為有效成分，是有效舒緩感冒各種症狀之綜合感冒藥。

○可以根據下列目的服用本藥劑。

舒緩感冒的各項症狀 ( 鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、咳嗽、有痰、惡寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛 )

## 服用本藥劑之前需注意什麼？①



請參照以下項目，確認是否可以服用本劑。

副作用 ( 因藥劑造成的有害反應 )，有研究表明有可能會誘發胃潰瘍、十二指腸潰瘍、重度氣喘的發作，引起發疹、浮腫等。詳見【服用本藥劑期間需注意什麼？】。

## 以下人群請勿服用本藥劑。

○曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者

○曾因服用本劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥而引起過氣喘者

【曾服用含有洛索洛芬鈉水合物、阿司匹林 ( 乙醯水楊酸 )、乙醯水楊酸鈣、乙氧基苯醯胺、異布洛芬、乙醯胺酚以及異丙基安替比林配方的感冒藥及解熱鎮痛藥而引起過氣喘者】

○未滿 15 歲的兒童

○在醫療機構接受以下治療者

●胃潰瘍、十二指腸潰瘍 ●肝臟病 ●腎臟病 ●心臟病

○曾被醫師告知患有以下血液異常 ( 血液疾患 ) 者

●紅血球數偏少 ( 貧血 )

●血小板數偏少 ( 不容易止血、容易出血 )

●白血球數偏少

○預產期在 12 週或以內的孕婦

## 服用本藥劑之前需注意什麼？②

以下人群在服用本藥劑時需注意。

服用前請諮詢醫師或藥師。

○正在接受醫師或牙科醫師治療者

○孕婦 ( 不包括預產期在 12 週或以內的孕婦 ) 或有可能懷孕者

○高齡者 ( 65 歲或以上 )

○曾對藥物等產生過敏症狀者

○患有以下症狀者

高燒、排尿困難

○被診斷出患有以下疾病者

●甲狀腺功能紊亂 ●糖尿病 ●心臟病 ●高血壓 ●青光眼

●支氣管哮喘 ●潰瘍性大腸炎 ●克羅恩氏病

●全身性紅斑狼瘡 ●混合型結締組織疾病

●呼吸功能障礙 ●阻塞性睡眠呼吸暫停症候群 ●肥胖症

○曾患有以下疾病者

●胃潰瘍、十二指腸潰瘍 ●肝臟病 ●腎臟病 ●血液疾患

## 服用本藥劑之前需確認什麼？

○請勿連續服用超過 5 天。 要點

即使服用 5 天后，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，接受醫師診療。

○服用本劑期間，請勿使用其他任何感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等 ( 鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏藥等 )。

【解熱鎮痛成分 [Aspirin (Acetylsalicylic Acid), Aspirin Aluminum, Ethenzamide, Ibuprofen, Acetaminophen and Isopropylantipyrene], 鎮靜成分 [Allylisopropylacetylurea, Bromovalerylurea], 鎮咳成分 [Tipepidine Citrate, Cloperastine Hydrochloride, Cloperastine Fendizoate, Codeine Phosphate Hydrate, Tipepidine Hibenzone, Dextromethorphan Hydrobromide Hydrate, Dextromethorphan Phenolphthalinate, Pentoxifyverine Citrate, Noscapine, Noscapine Hydrochloride Hydrate], 祛痰成分 [Guaifenesin, Potassium Guaiaacolsulfonate, Potassium Cresolsulphonate], 抗組織胺成分 [Chlorpheniramine Maleate, d-Chlorpheniramine Maleate, Diphenylpyraline Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride, Diphenhydramine Salicylate, Triprolidine Hydrochloride Hydrate, Promethazine Methylene disalicylate, Carbinoxamine Maleate, Mequitazine] 等包括以上成分之其他醫藥品】

○服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。

( 可能出現嗜睡等。 )

○哺乳期婦女請勿服用本劑，如需服用本劑請勿哺乳。

○服用前後請勿飲酒。

## 如何使用本藥劑？

○服用量及服用次數

請依照下述用量與次數服用。使用前請務必閱讀附在產品內之說明書，並嚴格遵守用法與用量，正確使用。

請以下列用量配冷水或溫水服用。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
成人 ( 15 歲或以上 )	2 錠	3 次 請盡量於餐後半小時內服用。
未滿 15 歲	請勿服用。	

○服用 5 至 6 次後症狀並無改善時，有可能患有其他疾患或並發症之情形，請停止服用本劑，並攜帶此說明書，諮詢醫師或藥師。

( 特別是發燒連續 3 天或以上，或反復發燒時 )

○如何服用？

請用 1 杯冷水或溫水送服。

○服用量過多時 ( 過量攝取時 ) 的因應方式

誤將藥劑過量服用時，請諮詢醫師或藥師。

## 服用本藥劑期間需注意什麼？

○服用後可能出現體溫過度下降、虛脫(乏力)、四肢冰冷(手腳冰冷)等症狀。出現此類症狀時，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師或藥師。



○服藥後若出現消化性潰瘍(腹脹、胸口灼熱、後背疼痛)、浮腫等情形，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師或藥師。另外，偶爾會發生消化道出血(出現吐血、噁心及嘔吐、腹痛、黑色黏稠的糞便、血便等症狀)、消化道穿孔(消化道開孔。出現噁心及嘔吐、劇烈腹痛等症狀)、小腸及大腸狹窄、梗阻(出現噁心及嘔吐、腹痛、腹部膨脹等症狀)等嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

## 服用本藥劑期間需注意什麼？

(1)服用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師或藥師。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	腹痛、胃部不適感、食慾不振、噁心及嘔吐、腹部膨脹、胸口灼熱、口內炎、消化不良
循環器官	血壓上升、心悸
精神神經系統	發麻、頭暈、頭痛、亢奮、痙攣
泌尿系統	排尿困難、血尿
其他	胸痛、倦怠感、臉部發燙、發燒、貧血

(2)偶爾會發生特別需要注意的副作用，這裡記載有各主要自覺症狀。副作用之情形，各副作用所記載的主要自覺症狀中，數個症狀同時出現的情況較為常見。此情形時，請立即停止服用本劑，接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	服用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
血液障礙	出現咽喉疼痛、發燒、全身倦怠、臉部及眼皮內側泛白、易出血(牙齦出血、鼻血等)、瘀青(按壓後也不會褪色)等症狀。
史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、多形性紅斑、急性廣泛性發疹性膿疱症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、咽喉疼痛、皮膚廣範圍發疹或發紅，水皰出現在皮膚的紅色部位、變紅的皮膚上出現小顆粒(小膿疱)、全身倦怠、沒有食慾等症狀持續，或者突然惡化。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等症狀。
鬱血性心臟衰竭	出現全身倦怠、心悸、氣短、胸部不適感、胸痛、頭暈、昏厥等症狀。
心肌梗塞	胸部絞痛、呼吸困難、冒冷汗。
腦血管障礙	突然出現意識減退及喪失、單側手腳不易動彈、頭痛、嘔吐、頭暈、口齒不清、說話困難等症狀
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體活動時，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者這些症狀持續。

症狀名稱	症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等症狀。
橫紋肌溶解症	手腳、肩膀、腰等的肌肉疼痛、手腳痠麻、無力、僵硬、全身倦怠、紅褐色尿等。
無菌性腦膜炎	出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐等。(尤其在接受全身性紅斑狼瘡或混合型結締組織疾病治療者當中，通報有多數此類症狀。)
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。
呼吸抑制	出現氣短、呼吸困難等。

(3)服用後可能出現以下症狀，若觀察到此症狀持續出現或惡化，請停止服藥，並攜帶本說明書向醫師或藥師諮詢。

口乾、便秘、腹瀉、嗜睡

## 本藥劑中含有什麼成分？

銷售名稱	LOXONIN 綜合感冒藥
有效成分名、含量 (1日量6錠中)	Loxoprofen sodium hydrate 204.3mg (按無水物計算為 180 mg)
	Dihydrocodeine phosphate 24mg
	dl-Methylephedrine hydrochloride 60mg
	Bromhexine hydrochloride 12mg
	Clemastine fumarate 1.34mg
添加劑	D-Mannitol, Cellulose, Hydroxypropylcellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium oxide, Talc, Carnuba Wax

## 其他

○如何保管本藥劑？

- 請保管於陽光直射不到(濕氣少)的陰涼處。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿換裝於其他容器(易導致誤用或變質)。

○請勿使用超過所標示的使用期限之產品。

## 關於本藥劑的諮詢窗口在哪裡？

○有關通常事宜之疑問，請向下述窗口諮詢。

## 第一三共醫療保健株式會社

(<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>)

顧客諮詢窗口

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00~17:00(週六、週日及節假日除外)

○有關症狀、使用方法、副作用等更詳細之疑問，請諮詢醫師或藥師。



生產銷售商

第一三共醫療保健株式會社

Daiichi-Sankyo 東京都中央區日本橋 3-14-10