

使用前请务必阅读本说明书。
同时应对此说明书进行妥善保管，以便在必要时随时取阅。

第2类医药品

针对难耐的肩痛、腰痛、关节痛

LOXONIN®S 凝胶

LOXONIN S 凝胶的特点

含有消炎止痛效果良好的物质 [洛索洛芬钠水合物]。

- 被皮肤吸收后成分活性化，直接渗透至难耐疼痛深处发挥良好效果。
- 不粘腻，速干型凝胶。
- 无香料、无色透明，气味小，隐形凝胶。



使用注意事项



禁止事项

(若不遵守可能会导致目前的症状恶化或容易产生副作用)

1. 以下人群请勿使用。

- (1) 曾因本剂或本剂所含成分而引发过敏症状者
- (2) 曾因使用本剂或其他解热镇痛药、感冒药、外用镇痛消炎药而引起过气喘者
- (3) 未满 15 岁的儿童

2. 请勿使用于以下部位。

- (1) 眼睛周围、黏膜等
- (2) 皮肤中较敏感的部位 (脸部、腋下等)
- (3) 湿疹、斑疹、伤口处
- (4) 脚癣、顽癣等或化脓患处

3. 使用本剂期间，请勿使用其他任何外用镇痛消炎药。

4. 请勿连续使用 2 周或以上。

(本剂为一时缓解疼痛的药剂。若疼痛等症状持续时，请停止使用本剂，接受医师诊疗)



咨询事项

1. 以下人群请在使用前咨询医师、药剂师或登录销售者。

- (1) 正在接受医师诊疗者
- (2) 曾对药物等产生过敏症状者
- (3) 孕妇或有可能怀孕者
- (4) 高龄者
- (5) 被诊断出患有以下疾病者
支气管哮喘

2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

相 关 部 位	症 状
皮 肤	发疹、发红、发痒、肿胀、刺痛感、斑疹、水疱、色素沉淀
消 化 器 官	胃部不适感、胸口痛
其 他	浮肿

极少可能会引发下列严重症状。该情况下，请立刻接受医师诊疗。

症状名称	症 状
休 克 (过敏性)	使用后马上出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。

3. 使用后，可能会出现下列症状的情况，此症状持续或变严重时请停止使用本剂，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。 腹泻、软便

4. 使用5至6天后症状并无改善时，请停止使用本剂，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。(有可能患有其他疾患)

功效

腰痛、伴随肩部酸痛的肩部疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手及手腕疼痛）、肘部疼痛（网球肘等）、跌打、挫伤

用法及用量

1天3至4次，适量涂抹于患处。

〈用法及用量相关的注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法及用量。
- (2) 请勿将保鲜膜等不透气材质包裹于涂抹本剂的部位。
- (3) 本剂并非为根治疼痛及肿胀等症状，而是缓解疼痛及肿胀等症状的药剂，因此请仅在出现症状时使用。
- (4) 请遵守用量，1次用量不要超过8cm（约2g），1周用量不要超过50g。
- (5) 请注意不要让药剂进入眼睛。不慎进入眼睛时，请马上用凉水或温水清洗。如症状严重时应前往眼科就诊。
- (6) 本剂仅限外用。
- (7) 使用本剂后请洗手。

成分及含量

本剂为无色至微黄色透明啫喱状凝胶药剂，每100g中含有以下成分。

成分	含量
Loxoprofen sodium hydrate	1.13g（按无水物计算为1g）

添加剂：Ethanol, 1,3-butylene glycol, hypromellose, carboxy vinyl polymer, triethanolamine

保管及使用上的注意事项

- (1) 请密封保管于阳光直射不到的阴凉处。
- (2) 请保管于儿童拿不到的地方。
- (3) 请勿换装于其他容器中。（可能导致误用或变质）
- (4) 请勿存放于明火附近。
- (5) 本剂会使化学纤维、塑料类、涂漆面等溶化，请勿使其附着于地板、家具、眼镜等物品。
- (6) 请勿使用已超过所标识的使用期限的产品。另外，打开包装后请尽快使用。

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮政编码103-8234 东京都中央区日本桥3-14-10

电话号码：0120-337-336

受理时间：9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

05®注册商标



生产销售商

第一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥 3-14-10