

使用前請務必閱讀本說明書。  
同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時隨時取閱。

## 第 2 類醫藥品

針對難耐之肩痛、腰痛、關節痛

LOXONIN<sup>®</sup>S 凝膠

## LOXONIN S 凝膠之特點

配有消炎止痛效果良好之成分 [ 洛索洛芬鈉水合物 ] 。

- 被皮膚吸收後成分活性化，直接滲透至難耐疼痛深處發揮良好效果。
- 不黏膩，速乾型凝膠。
- 不含香料、無色透明狀，氣味小，隱形凝膠。



## 使用上注意事項

## 禁止事項

( 若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用 )

## 1. 以下人群請勿使用。

- (1) 曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
- (2) 曾因本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥、外用鎮痛消炎藥而引起過氣喘者
- (3) 未滿 15 歲的兒童

## 2. 請勿使用於以下部位。

- (1) 眼睛周圍、黏膜等
- (2) 皮膚中較敏感之部位 ( 面部、腋下等 )
- (3) 濕疹、斑疹、傷口處
- (4) 腳癬、頑癬等或化膿患處

## 3. 使用本劑期間，請勿使用其他任何外用鎮痛消炎藥。

## 4. 請勿連續使用 2 週或以上。

( 本劑可一時舒緩疼痛。若疼痛等症狀持續時，請停止使用本劑，接受醫師診療 )



## 諮詢事項

## 1. 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

- (1) 正在接受醫師治療者
- (2) 曾對藥物等產生過敏症狀者
- (3) 孕婦或有可能懷孕者
- (4) 高齡者
- (5) 被診斷出患有以下疾病者  
支氣管哮喘

## 2. 使用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

| 相關部位 | 症狀                         |
|------|----------------------------|
| 皮膚   | 發疹、發紅、發癢、腫脹、刺痛感、斑疹、水皰、色素沉著 |
| 消化器官 | 胃部不適感、胸口疼痛                 |
| 其他   | 浮腫                         |

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

| 症狀名稱       | 症狀  |
|------------|---|
| 休克 ( 過敏性 ) | 使用後馬上出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。 |

## 3. 使用後，可能會出現下列症狀之情形，此症狀情形持續或變嚴重時請停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。 腹瀉、軟便

## 4. 使用 5 至 6 天後症狀並無改善時，請停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。( 有可能患有其他疾患 )

## 功效

腰痛、伴隨肩膀痠痛的肩膀痛、關節痛、肌肉疼痛、腱鞘炎（手、手腕的疼痛）、手肘痛（網球肘等）、撞傷、扭傷

## 用法及用量

1天3至4次，適量塗抹於患處。

〈用法及用量相關之注意事項〉

- (1) 請嚴格遵守用法及用量。
- (2) 請勿將保鮮膜等不透氣之材質包裹於塗抹本劑之部位。
- (3) 本劑並非為根治疼痛及腫脹之病源，僅為舒緩疼痛及腫脹等症狀之藥劑，因此僅限於出現症狀時使用。
- (4) 請遵守用量，1次用量不要超過8cm（約2g），1週用量不要超過50g。
- (5) 請注意不要使藥劑進入眼睛。若不慎進入眼睛，請立即用涼水或溫水清洗。若症狀嚴重時應前往眼科就診。
- (6) 本藥劑僅限於外用。
- (7) 使用本藥劑後請洗手。

## 成分及含量

本劑為無色至微黃色透明果凍狀凝膠藥劑，每100g中含有以下成分。

| 成分                        | 含量               |
|---------------------------|------------------|
| Loxoprofen sodium hydrate | 1.13g（按無水物計算為1g） |

添加物：Ethanol, 1,3-butylene glycol, hypromellose, carboxy vinyl polymer, triethanolamine

## 保管及使用上的注意事項

- (1) 請密封保管於陽光直射不到的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請不要移至其他容器中。（會導致誤用或變質）
- (4) 請勿存放於明火附近。
- (5) 本劑會使化學纖維、塑料類、塗漆面等溶化，請勿使其附著在地板、家具、眼鏡等物品上。
- (6) 請勿使用已超過所標識的使用期限之產品。另外，打開包裝後請盡快使用。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

**第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口**

郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10

電話號碼：0120-337-336

受理時間：9:00~17:00（週六、週日及節假日除外）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

05®註冊商標



製造銷售商

**第一三共醫療保健株式會社**