

## 第 2 類醫藥品

針對肩部、腰部、關節之難耐疼痛

## LOXONIN®S 硬質凝膠

## LOXONIN S 硬質凝膠之特點

- 配有消炎止痛效果良好之成分 [ 洛索洛芬鈉水合物 ] 。
- 棒狀硬質凝膠，可不沾手，廣範圍塗抹發揮療效。
  - 無香料、半透明狀，無刺激氣味，塗抹後不明顯。
  - 質地乾爽不黏膩，塗抹後可立刻穿上衣服。



## 使用上注意事項

## 禁止事項

( 若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用 )

## 1. 以下人群請勿使用。

- (1) 曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
- (2) 曾因本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥、外用鎮痛消炎藥而引起過氣喘者
- (3) 未滿 15 歲的兒童

## 2. 請勿使用於以下部位。

- (1) 眼睛周圍、黏膜等
- (2) 皮膚中較敏感之部位 ( 面部、腋下等 )
- (3) 濕疹、斑疹、傷口處
- (4) 腳癬、頑癬等或化膿患處

## 3. 使用本劑期間，請勿使用其他任何外用鎮痛消炎藥。

## 4. 請勿連續使用 2 週或以上。

( 本劑可一時舒緩疼痛。若疼痛等症狀持續時，請停止使用本劑，接受醫師診療 )



## 諮詢事項

## 1. 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥師或登錄銷售者。

- (1) 正在接受醫師治療者
- (2) 曾對藥物等產生過敏症狀者
- (3) 孕婦或有可能懷孕者
- (4) 高齡者
- (5) 被診斷出患有以下疾病者 支氣管哮喘

## 2. 使用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥師或登錄銷售者。

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、發癢、腫脹、刺痛感、斑疹、水皰、色素沉著
消化器官	胃部不適感、胸口疼痛
其 他	浮腫

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症 狀
休克( 過敏性 )	使用後馬上出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

## 3. 使用後，可能會出現下列症狀之情形，此症狀情形持續或變嚴重時請停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥師或登錄銷售者。 腹瀉、軟便

## 4. 使用 5 至 6 天後症狀並無改善時，請停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥師或登錄銷售者。( 有可能患有其他疾患 )

## 功效

腰痛、伴隨肩膀痠痛的肩膀痛、關節痛、肌肉疼痛、腱鞘炎（手、手腕的疼痛）、手肘痛（網球肘等）、撞傷、扭傷

## 用法及用量

1天3至4次，適量塗抹於患處。

〈用法及用量相關之注意事項〉



- (1) 請嚴格遵守用法及用量。
- (2) 請勿將保鮮膜等不透氣材質包裹於塗抹本劑之部位。
- (3) 本劑並非為根治疼痛及腫脹之病源，僅為舒緩疼痛及腫脹等症狀之藥劑，因此僅限於出現症狀時使用。
- (4) 1次最大用量約2g（塗抹面積：約10個手掌大小），1週用量不要超過50g。
- (5) 請注意不要使藥劑進入眼睛。若不慎進入眼睛，請立即用涼水或溫水清洗。若症狀嚴重時應前往眼科就診。
- (6) 本藥劑僅限於外用。
- (7) 出汗或患處濕漉時，請將患處充分擦乾後使用。
- (8) 為避免容器直接碰觸患處，請將容器中之藥劑膏體伸出3至4mm後使用。
- (9) 如果可以看到藥劑底盤，藥劑膏體鬆動時，請停止使用本藥劑。  
請不要勉強使用底盤上殘存之藥劑。

### 《容器使用方法》

1. 擰開上部之藥劑蓋。

2. 向右（從底部看順時針方向）轉動下部轉鈕，使藥劑伸出3至4mm。

3. 按壓至患處適量塗抹。



4. 使用後向左（從底部看逆時針方向）將轉鈕轉到最後收回藥劑膏體，請務必將蓋子擰緊保管。

## 成分及含量

每100g中含有以下成分。

成分	含量	作用
Loxoprofen sodium hydrate	1.13 g (按無水物計算為 1 g)	抑制炎症及疼痛的根源【前列腺素】。

添加物：Sodium stearate, Macrogol stearate, Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil, Sodium hydroxide, Ethanol

## 保管及使用上的注意事項

- (1) 請密封保管於陽光直射不到的陰涼處。
- (2) 由於本劑具有揮發性，請在使用後擰緊蓋子，使其不接觸到外部空氣。
- (3) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (4) 請不要移至其他容器中。（會導致誤用或變質）
- (5) 請勿存放於明火附近。
- (6) 本劑會使化學纖維、塑料類、塗漆面等溶化，請勿使其附著在地板、家具、眼鏡等物品上。
- (7) 請勿使用已超過所標識的使用期限之產品。即使在使用期間內，也請在開封後馬上用完。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10

電話號碼：0120-337-336 受理時間：9:00～17:00（週六、週日及節假日除外）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®註冊商標



製造銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10