

迅速舒緩疼痛

ロキソニンS

LOXONIN S

日本藥典配方 洛索洛芬鈉錠劑

迅速舒緩+呵護胃黏膜成分

ロキソニンSプラス

LOXONIN S plus

迅速舒緩+保護胃黏膜成分

ロキソニンSクイック

LOXONIN S QUICK

迅速舒緩難耐疼痛+保護胃黏膜成分 速效+考慮到生理痛產生之機制

ロキソニンSプレミアム

LOXONIN S PREMIUM

ロキソニンS

プレミアムファイン

LOXONIN S PREMIUM fine

銷售名稱	LOXONIN S	LOXONIN S plus	LOXONIN S QUICK	銷售名稱	LOXONIN S PREMIUM	LOXONIN S PREMIUM fine
成分與含量 (每 1 錠)	洛索洛芬鈉水合物 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg)	洛索洛芬鈉水合物 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg) 氧化鎂 33.3 mg	洛索洛芬鈉水合物 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg) 矽酸鎂 100 mg	成分與含量 (每 2 錠)	洛索洛芬鈉水合物 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg) 丙烯異丙乙酰胺 60 mg 無水咖啡因 50 mg 矽酸鎂 100 mg	洛索洛芬鈉水合物 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg) 芍藥乾燥萃取物 36 mg (按原生藥計算為 252 mg) 橙皮苷 30 mg 矽酸鎂 100 mg
醫藥品分類	第 1 類醫藥品	第 1 類醫藥品	第 1 類醫藥品	醫藥品分類	第 1 類醫藥品	第 1 類醫藥品

本藥劑有什麼效果？

- 本藥劑屬於非類固醇消炎止痛藥品 (NSAIDs) 類群的解熱鎮痛藥。
- 本藥劑可抑制產生疼痛、炎症、發燒之根源「前列腺素」，舒緩疼痛、退燒。
- 可以根據下列目的服用本藥劑。
 - 頭痛、月經痛 (生理痛)、牙痛、拔牙後的疼痛、咽喉疼痛、腰痛、關節痛、神經痛、肌肉痛、肩膀痠痛、耳痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、外傷痛的鎮痛。
 - 惡寒、發燒時的解熱

購買本藥劑之前需確認什麼？

- 請參照以下項目，確認是否可以服用本劑。
- 副作用 (因藥劑造成的有害反應)，有研究表明有可能會誘發胃潰瘍、十二指腸潰瘍、重度氣喘的發作，引起發疹、浮腫等。
- 詳見【服用本藥劑期間需注意什麼？】。


以下人群請勿服用本藥劑

- 曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
- 曾因服用本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥而引起過氣喘者
 - 【曾服用含有洛索洛芬鈉水合物、阿司匹林 (乙醯水楊酸)、乙醯水楊酸鋁、乙氧基苯醯胺、異布洛芬、乙醯胺酚以及異丙基安替比林配方的解熱鎮痛藥及感冒藥而引起過氣喘者】
- 未滿 15 歲的兒童
- 在醫療機構接受以下治療者
 - 胃潰瘍、十二指腸潰瘍 ● 肝臟病 ● 腎臟病 ● 心臟病
- 曾被醫師告知患有以下血液異常 (血液疾患) 者
 - 紅血球數偏少 (貧血)
 - 血小板數偏少 (容易血流不止、容易出血)
 - 白血球數偏少
- 預產期在 12 週以內的孕婦


以下人群在服用本藥劑時需注意。
購買前請諮詢醫師、牙科醫師或藥劑師。

- 正在接受醫師或牙科醫師治療者
- 孕婦 (不包括預產期在 12 週以內的孕婦) 或有可能懷孕者
- 哺乳期間婦女
- 高齡者 (65 歲或以上)
- 曾對藥物等產生過敏症狀者
- 被診斷出患有以下疾病者
 - 支氣管哮喘 ● 潰瘍性大腸炎 ● 克羅恩氏病
 - 全身性紅斑狼瘡 ● 混合型結締組織疾病
- 曾患有以下疾病者
 - 胃潰瘍、十二指腸潰瘍 ● 肝臟病 ● 腎臟病 ● 血液疾患

服用本藥劑時需確認什麼？

- 本劑並非治愈造成疼痛及發熱等症狀的疾病本身，而是舒緩所出現的症狀。因此請僅在出現症狀時服用。
- 服用 1 至 2 次後症狀並無改善時，有可能患有其他疾患，此時請停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、牙科醫師或藥劑師。
- 請勿長期連續服用。 要點
(服用 3~5 天後，疼痛等症狀仍反覆出現時，請停止服用，並接受醫師診療)
- 服用本劑的期間，請勿服用以下任何醫藥品。
其他含有阿司匹林 (乙醯水楊酸)、乙醯水楊酸鋁、乙氧基苯醯胺、異布洛芬、乙醯胺酚以及異丙基安替比林配方的解熱鎮痛藥、感冒藥及含有丙烯異丙乙酰胺、溴化羰草酸的鎮靜藥、**暈車藥【僅限於 LOXONIN S PREMIUM】**
- 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。
(可能出現嗜睡等)【僅限於 LOXONIN S PREMIUM】
- 服用前後請勿飲酒。
【攝取酒精時請勿服用本藥劑。】

如何使用本藥劑？

- 服用量及服用次數  要點
成人 (15 歲或以上) 在出現症狀時，請依照下述用量，盡量避免空腹時，用冷水或溫水送服。通常 **1 天最多服用 2 次**。
若再次出現疼痛等症狀時，可服用第 3 次。請確保 4 小時或以上的服藥間隔。

LOXONIN S	LOXONIN S plus	LOXONIN S QUICK	LOXONIN S PREMIUM	LOXONIN S PREMIUM fine
每次 1 錠	每次 1 錠	每次 1 錠	每次 2 錠	每次 2 錠

※服用前請務必閱讀附屬在內的說明書，並遵守用法用量正確使用。

- 如何服用？
請用 1 杯冷水或溫水送服。
- 服用量過多時 (過量攝取時) 的因應方式
誤將藥劑過量服用時，請諮詢醫師或藥劑師。

服用本藥劑期間需注意什麼？

- 服用類似於本藥劑的解熱鎮痛藥之後，會出現體溫過度下降、虛脫 (乏力)、四肢冰冷 (手脚冰冷) 等症狀。出現此類症狀時，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師或藥劑師。
- 服藥後若出現消化性潰瘍 (腹脹、胸口灼熱、後背疼痛)、浮腫等情形，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師或藥劑師。另外，偶爾會發生消化道出血 (出現吐血、噁心及嘔吐、腹痛、黑色黏稠的糞便、血便等症狀)、消化道穿孔 (消化道開孔。出現噁心及嘔吐、劇烈腹痛等症狀)、小腸及大腸狹窄、梗阻 (出現噁心及嘔吐、腹痛、腹部膨脹等症狀) 等嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

是否有副作用？

- (1) 服用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師或藥劑師。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	腹痛、胃部不適感、食慾不振、噁心及嘔吐、腹部膨脹、胸口灼熱、口內炎、消化不良
循環器官	血壓上升、心悸
精神神經系統	睡意、痠麻、頭暈、頭痛
其他	胸痛、倦怠感、臉部發燙、發燒、貧血、血尿

- (2) 偶爾會發生特別需要注意的副作用，這裡記載有各主要自覺症狀。副作用之情形，各副作用所記載的主要自覺症狀中，數個症狀同時出現的情況較為常見。此情形時，請立即停止服用本劑，接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	服用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
血液障礙	出現咽喉疼痛、發燒、全身倦怠、臉部和眼皮內側泛白、易出血(牙齦出血、鼻血等)、淤青(按壓後也不會褪色)等症狀。
史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、多形性紅斑、急性廣泛性發疹性膿疱症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、咽喉疼痛、皮膚廣範圍發疹或發紅，水皰出現在皮膚的紅色部位、發紅的皮膚上出現小顆粒(小膿疱)、全身倦怠、沒有食慾等症狀持續或者突然惡化。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等症狀。
鬱血性心臟衰竭	出現全身倦怠、心悸、氣短、胸部不適感、胸痛、頭暈、昏厥等症狀。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體活動時，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等症狀。
橫紋肌溶解症	手腳、肩膀、腰等的肌肉疼痛、腳痠麻、無力、僵硬、全身倦怠、紅褐色尿等。
無菌性腦膜炎	出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐等。(尤其在接受全身性紅斑狼瘡或混合型結締組織疾病治療者當中，通報有多數此類症狀。)
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

將前述【服用本藥劑期間需注意什麼？】中所示的自覺症狀按照症狀所出現的部位排列如下。發現這些症狀時，請參考上述(2)特別需要注意的副作用的表格。

部位	自覺症狀
全身	體溫低於正常體溫、乏力、全身浮腫、身體浮腫、發燒、全身倦怠、高燒、嗜睡、肌肉緊繃
頭部	頭暈、伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、頭痛、暈倒
臉部	臉色蒼白、鼻血、發燙
眼睛	眼皮內側泛白、眼白變黃、眼睛充血、眼屎
耳朵	耳鳴
口腔及咽喉	吐血、咽喉疼痛、牙齦出血、噁心、嘔吐、乾咳(沒有痰的咳嗽)、口內炎、唇部及口腔內潰爛、聲音沙啞、打噴嚏、咽喉癢
胸部	胸口灼熱、呼吸困難、心悸、氣短、胸部不適感、胸痛、難以呼吸、氣喘呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲。
腹部	腹脹、腹痛、胃部不適感、食慾不振、膨脹感、消化不良、劇烈腹痛
後背	後背疼痛、肩部及腰部的肌肉痛
手、腳	手腳冰涼、痠麻、關節痛(各關節疼痛)、肌肉痛
皮膚	蕁麻疹、起青斑、發疹、發紅、廣範圍發疹或發紅、水皰出現在皮膚的紅色部位、皮膚變黃、發癢

便	黑色黏稠的糞便、有血的糞便、腹瀉
尿	排尿量減少、血尿、褐色的尿、紅褐色的尿
其他	血壓容易上升、容易出血

- (3) 服用後，可能會出現下列症狀之情形，此症狀情形持續或變嚴重時請停止服用本劑，並攜帶此說明書，諮詢醫師或藥劑師。

口乾、便秘、腹瀉

本藥劑中含有什麼成分？

LOXONIN S

有效成分	每1錠 Loxoprofen sodium hydrate 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg)
添加物	hydroxypropylcellulose, magnesium stearate, lactose monohydrate, red ferric oxide

根據錠劑會有因添加物造成的紅色斑點

LOXONIN S plus

有效成分	每1錠 Loxoprofen sodium hydrate 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg) Magnesium oxide 33.3 mg
添加物	lactose, cellulose, hydroxypropylcellulose, croscarmellose sodium, calcium stearate, hypromellose, titanium oxide, red ferric oxide, carnauba wax

LOXONIN S QUICK

有效成分	每1錠 Loxoprofen sodium hydrate 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg) Magnesium aluminometasilicate 100 mg
添加物	anhydrous dibasic calcium phosphate, lactose, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, magnesium stearate

LOXONIN S PREMIUM

有效成分	每2錠 Loxoprofen sodium hydrate 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg) Allylisopropylacetylurea 60 mg Anhydrous caffeine 50 mg Magnesium aluminometasilicate 100 mg
添加物	lactose, cellulose, hydroxypropylcellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, talc, red ferric oxide, carnauba wax

LOXONIN S PREMIUM fine

有效成分	每2錠 Loxoprofen sodium hydrate 68.1 mg (按無水物計算為 60 mg) Paeonia dry extract 36 mg (按原生藥計算為 252 mg) Hesperidin 30 mg Magnesium aluminometasilicate 100 mg
添加物	D-Mannitol, cellulose, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, macrogol, red ferric oxide, carnauba wax

其他

- 如何保管本藥劑？
 - 請保管於陽光直射不到(濕氣少)的陰涼處。
 - 請保管於兒童拿不到的地方。
 - 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質)。

【LOXONIN S、LOXONIN S QUICK】

- 請勿使用超過所標示的使用期限之產品。

【LOXONIN S plus、LOXONIN S PREMIUM、LOXONIN S PREMIUM fine】

- 請勿使用超過所標示的使用期限之產品。
另外，請在打開鋁包裝袋後6個月或以內使用。
- 請在包裝盒的「開封年月日」填寫欄中，填寫打開鋁包裝袋的日期。

關於本藥劑的諮詢窗口在哪裡？

- 有關通常事宜之疑問，請向下列諮詢窗口。

第一三共醫療保健株式會社

(<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>)

顧客諮詢窗口

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話號碼：0120-337-336

受理時間：9:00~17:00(週六、週日、節假日以及公司假日除外)

- 有關症狀、副作用等更詳細之疑問，請諮詢醫師、牙科醫師或藥劑師。