

使用前请务必阅读本包装盒上的说明书。同时应对此说明书进行妥善保管，以便在必要时随时取阅。

镇痛消炎药 第2类医药品 7片装
LOXONIN®S 膏贴 (7片x1袋)

特点

含有消炎止痛效果良好的物质 [洛索洛芬钠水合物]。

被皮肤吸收后成分活性化，
直接渗透至难耐疼痛深处发挥良好效果。

1天使用1次。贴敷感舒适，
伸缩性强不易脱落，方便重新贴敷。



使用注意事项

禁止事项

(若不遵守可能会导致目前的症状恶化或容易产生副作用)

- 以下人群请勿使用。
 - 曾因本剂或本剂所含成分而引发过过敏症状者。
 - 曾因使用本剂或其他解热镇痛药、感冒药、外用镇痛消炎药而引起过气喘者
 - 未满15岁的儿童
- 请勿使用于以下部位。
 - 眼睛周围、黏膜等 (2)湿疹、斑疹、伤口处
 - 脚癣、顽癣等化脓患处
- 使用本剂期间，请勿使用其他任何外用镇痛消炎药。
- 请勿连续使用2周或以上。(本剂为一时抑制疼痛的药剂。若疼痛等症状持续时，请停止使用本剂，接受医师诊疗)



咨询事项

- 以下人群请在使用前咨询医师、药剂师或登录销售者。
 - 正在接受医师治疗者
 - 曾对药物等产生过过敏症状者
 - 孕妇或有可能怀孕者 (4)高龄者
 - 被诊断出患有以下疾病者 支气管哮喘

2.使用后出现以下症状时可能为副作用。此情形时，请立即停止使用，并携带本包装盒，咨询医师、药剂师或登录销售者。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒、肿胀、刺痛感、斑疹、水疱、出现淤青、色素沉淀
消化器官	胃部不适感、胸口痛
其他	浮肿

极少可能会引发下列严重症状。
该情况下，请立刻接受医师诊疗。

症状名称	症状
休克(过敏性)	使用后马上出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。

- 使用后，可能会出现下列症状的情况，此症状持续或变严重时请停止使用本品，并携带本包装盒，咨询医师、药剂师或登录销售者。
腹泻、软便
- 使用5至6天后症状并无改善时，请停止使用本品，并携带本包装盒，咨询医师、药剂师或登录销售者。(有可能患有其他疾患)

功效

腰痛、伴随肩部酸痛的肩部疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎(手及手腕疼痛)、肘部疼痛(网球肘等)、跌打、挫伤

用法及用量

揭开表面贴纸(薄膜)，1天1次贴敷于患处。

〈用法及用量相关注意事项〉(1)请严格遵守用法及用量。(2)本剂并非为根治疼痛及肿胀等症状，而是缓解疼痛及肿胀等症状的药剂，因此请仅在出现症状时使用。(3)1天用量不能超过4片。(4)出汗或患处湿漉时，请擦拭干净后使用。(5)皮肤较敏感者，请在使用前向手腕内侧皮肤较敏感处，用边长1至2cm的小方形贴片贴敷观察半天或以上，在确认没有起疹、发红、发痒、斑疹等症状后使用。

成分与分量(每100g膏体中)

成分	含量	作用
Loxoprofen sodium hydrate	5.67 g (按无水物计算为5g)	抑制炎症及疼痛的根源【前列腺素】。

添加剂: Styrene-isoprene-styrene-block copolymer (SIS), polyisobutylene, hydrogenated rosin glycerol ester, BHT, l-menthol, liquid paraffin, 及其他2种成分

[每片(7cm×10cm)膏体量1g]

保管及使用上的注意事项

- 请保管于阳光直射不到且湿气少的阴凉处。(2)请保管于儿童拿不到的地方。(3)请勿换装于其他容器。(可能导致误用或变质)(4)为保证产品质量，请将开封后未使用的产品装入口袋，并将口袋密封保管。(5)请勿使用已超过所标识的使用期限的产品。另外，打开铝包装袋后，请尽快使用。

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮政编码103-8234 东京都中央区日本桥3-14-10

电话号码 0120-337-336 受理时间 9:00~17:00(周六、周日及节假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

副作用被害救济制度

电话号码 0120-149-931

07®注册商标

销售商
第一三共医药保健株式会社

MADE IN JAPAN

东京都中央区日本桥3-14-10

生产销售商

LEAD CHEMICAL株式会社

富山县富山市日俣77-3