

使用前請務必閱讀本包裝盒上之說明書。
同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時隨時取閱。

鎮痛消炎藥 LOXONIN®S 貼布 L 第2類醫藥品

7 片裝
(7 片裝 x1 袋)

特點

配有消炎止痛效果良好之成分 [洛索洛芬鈉水合物]。

被皮膚吸收後成分活性化，
直接滲透至難耐疼痛深處發揮良好效果。

1 天使用 1 次。貼敷感舒適，
伸縮性良好不易脫落，方便重新貼敷。

大尺寸膏藥貼，
方便貼敷於大面積患處。

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用)

1. 以下人群請勿使用。

- (1) 曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
- (2) 曾因本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥、外用鎮痛消炎藥而引起過氣喘者
- (3) 未滿 15 歲的兒童

2. 請勿使用於以下部位。

- (1) 眼睛周圍、黏膜等 (2) 濕疹、斑疹、傷口處
- (3) 腳癬、頑癬等或化膿患處

3. 使用本劑期間，請勿使用其他任何外用鎮痛消炎藥。

4. 請勿連續使用 2 週或以上。(本劑可一時舒緩疼痛。

若疼痛等症狀持續時，請停止使用本劑，接受醫師診療)



諮詢事項

1. 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

- (1) 正在接受醫師治療者 (2) 曾對藥物等產生過敏症狀者
- (3) 孕婦或有可能懷孕者 (4) 高齡者 (5) 被診斷出患有以下疾病者 支氣管哮喘



使用上注意事項

2. 使用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止使用本品，並攜帶本包裝盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、腫脹、刺痛感、斑疹、水皰、出現瘀青、色素沉著
消化器官	胃部不適感、胸口疼痛
其他	浮腫

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 使用後，可能會出現下列症狀之情形，此症狀情形持續或變嚴重時請停止使用本品，並攜帶本包裝盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

腹瀉、軟便

4. 使用 5 至 6 天後症狀並無改善時，請停止使用本品，並攜帶本包裝盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。(有可能患有其他疾患)

功效

腰痛、伴隨肩膀痠痛的肩膀痛、關節痛、肌肉疼痛、腱鞘炎(手、手腕的疼痛)、手肘痛(網球肘等)、撞傷、扭傷

用法用量

請揭開表面貼紙(薄膜)，1 天 1 次貼敷於患處。

(用法及用量相關之注意事項) (1) 請嚴格遵守用法及用量。(2) 本劑並非為根治疼痛及腫脹之病源，僅為舒緩疼痛及腫脹等症狀之藥劑，因此僅限於出現症狀時使用。(3) 1 天用量不能超過 2 片。(4) 出汗或患處濕漉時，請擦拭乾淨後使用。(5) 皮膚較敏感者，請於使用前在手臂內側皮膚較敏感處，貼敷邊長 1 至 2cm 左右之方形貼片觀察半天或以上，在未確認到起疹、發紅、發癢、斑疹等症狀後使用。

成分及含量 (每 100g 膏體中)

成分	含量	作用
Loxoprofen sodium hydrate	5.67 g (按無水物計算為 5g)	抑制炎症及疼痛的根源【前列腺素】。

添加物: Styrene-isoprene-styrene-block copolymer (SIS), polyisobutylene, hydrogenated rosin glycerol ester, BHT, l-menthol, liquid paraffin, 及其他 2 種成分

[每片 (10cm×14cm) 膏體量 2g]

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。(2) 請保管於兒童拿不到的地方。(3) 請不要移至其他容器。(會導致誤用或變質)
- (4) 為保證產品品質，請將開封後未使用之產品裝入袋子中，並將袋子密封保管。
- (5) 請勿使用已超過所標識的使用期限之產品。另外，打開鋁包裝袋後，請盡快使用。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話號碼 0120-337-336 受理時間 9:00~17:00 (週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

副作用被害救濟制度 電話號碼 0120-149-931

MADE IN JAPAN

銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10

製造銷售商

LEAD CHEMICAL 株式會社

富山縣富山市日俣 77-3

07
®註冊商標