

镇痛消炎药

第2类医药品

(2贴x10组)

使用前请务必阅读本包装盒上的说明。另外，为在需要时取阅该说明书，请将其妥善保管。

LOXONIN S 膏贴 mini

20 贴装

(2贴x10组x1袋)

含有具备良好镇痛效果的 [洛索洛芬钠水合物]。

扫描二维码  
了解产品信息



产品特点

经皮肤吸收后变化为激活型，直接渗透至难耐疼痛深处，坚实发挥疗效。

1天使用1次。敷贴感舒适，伸缩性良好，不易脱落，方便重新敷贴。



使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致目前症状恶化，或引发副作用)

- 下述人群不要使用。
  - 曾因本药剂或本药剂成分出现过过敏反应的人群
  - 曾因使用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药、外用镇痛药而引发哮喘的人群
  - 未满15岁的儿童
- 请勿使用于以下部位。
  - 眼睛周围，以及粘膜等部位
  - 湿疹、皮肤炎症，以及伤口处
  - 脚气、皮癣等或化脓的患处
- 使用本药剂期间，请勿使用其他外用镇痛消炎药。
- 请勿连续使用2周或以上。  
(本药剂为暂时抑制疼痛的药剂。若疼痛等症状持续时，请暂停使用，并接受医师诊疗)



咨询事项

- 下述人群在使用前请咨询医师、药剂师或登录销售者。
  - 正在接受医师治疗的人群
  - 曾对药物等产生过敏症状的人群
  - 孕妇或有可能怀孕中的人群
  - 高龄人群
  - 被诊断出患有下述疾病的人群 支气管哮喘

- 使用后若出现下述症状，则可能为副作用。此时应立即中止使用，并携带本外包装盒，咨询医师、药剂师或登录销售者。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒、肿胀、刺痛感、斑疹、水疱、出现淤青、色素沉淀
消化器官	胃部不适感、胸口疼痛
其他	浮肿

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医接受诊疗。

症状名称	症状
休克(过敏性)	使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

- 使用后可能会出现下述症状，若该症状持续或加重时应中止使用，并携带本外包装盒咨询医师、药剂师或登录销售者。 腹泻、软便
- 若使用5至6天后症状仍无改善时，则应中止使用，并携带本外包装盒，咨询医师、药剂师或登录销售者。(有可能患有其他疾病)

功能主治

伴随腰痛、肩部酸痛的肩部疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎(手及手腕疼痛)、肘部疼痛(网球肘等)、跌打、挫伤

用法及用量

请揭开表面剥离层(薄膜)，1天1次贴敷于患处。

(用法及用量的相关注意事项)

- 请严格遵守用法与用量。
- 本药剂并非治疗疼痛及肿胀的根源，而是仅针对疼痛及肿胀等状况进行治疗，因此请仅在出现症状时使用。
- 1天用量不要超过8贴。
- 出汗，或者患处湿漉时，请擦拭干净后使用。
- 皮肤较为敏感者，请在使用前，先于手臂内侧等皮肤较为敏感的部位，贴敷约1~2cm大小的切片，并保持半天以上。确认未出现发疹、发红、发痒，以及斑疹后，再行使用。

成分及分量(每100g膏体中)

成分	分量	作用
Loxoprofen sodium hydrate	5.67 g (按无水物计算为5g)	抑制炎症与疼痛原因的【前列腺素】。

添加剂: Styrene-Isoprene-Styrene Block Copolymer, Polyisobutylene, Hydrogenated Rosin Glycerol Ester, BHT, l-Menthol, Liquid Paraffin, and 2 other ingredients  
[每贴(5cm×7cm)含膏量0.5g]

保管及使用注意事项

- 请避免阳光直射，保管于湿气小的阴凉处。
- 请保管于儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中(会导致误用或变质)。
- 为保证产品质量，开封后请将未使用的膏贴放回袋中，并将封口密封后妥善保存。
- 请勿使用超过标示使用期限的产品。铝袋开封后，请尽快使用。

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室  
邮编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10  
电话号码 0120-337-336  
工作时间 9:00~17:00 (周六、周日及节假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®注册商标



销售商  
第一三共医药保健株式会社  
Daiichi Sankyo 东京都中央区日本桥3-14-10

副作用被害救济制度  
电话号码 0120-149-931

MADE IN JAPAN

生产销售商  
LEAD CHEMICAL 株式会社  
富山县富山市日保 77-3



4 987107 676955