

鎮痛消炎藥

第 2 類醫藥品

(2 片 x10 組)

使用前請務必閱讀本包裝盒上之說明。
同時應對此說明進行妥善保管，以便在
必要時取閱。

LOXONIN S 貼布 mini 20 片裝

(2 片 x10 組 x1 袋)

產品
特點

添加具有良好鎮痛效果之 [洛索洛芬鈉水合物]。

經皮膚吸收後變化為激活型，直接
滲透至難耐疼痛之深處，發揮良好療效。

1 天使用 1 次。敷貼感舒適，
伸縮性良好，不易脫落，可輕鬆重新敷貼。

掃描 QR 碼
獲取產品資訊

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，
或容易產生副作用)

- 以下情形者請勿使用。
 - 曾因本劑或本劑成分而引發過敏症狀者
 - 曾因使用本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥、外用鎮痛消炎藥而引發氣喘者
 - 未滿 15 歲的兒童
- 請勿使用於以下部位。
 - 眼睛周圍，以及黏膜等部位
 - 濕疹、斑疹，以及傷口處
 - 足癬、頑癬等或正在化膿的患部
- 使用本劑期間，請勿使用其他外用鎮痛消炎藥。
- 請勿連續使用 2 週或以上。
(本藥劑可用於暫時抑制疼痛。若疼痛等症狀持續時，請停止使用，並接受醫師的診療)

諮詢事項

- 有以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或登錄銷售者諮詢。
 - 正在接受醫師治療者
 - 曾對藥物等產生過敏症狀者
 - 孕婦或有可能懷孕者
 - 高齡者
 - 被診斷出患有以下疾病者 支氣管哮喘

- 使用後出現以下症狀，有可能為副作用。此時請立即停止使用，並攜帶本外包装盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、腫脹、刺痛感、斑疹、水皰、出現瘀青、色素沉澱
消化器官	胃部不適感、胸口疼痛
其他	浮腫

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

- 使用後，可能會出現下列症狀，此症狀持續或加重時請停止使用，並攜帶此外包装盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
腹瀉、軟便
- 使用 5~6 次後，症狀並沒有改善之情況下，請停止使用，並攜帶本外包装盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。(有可能患有其他疾病)

功效

伴隨腰部疼痛、肩膀痠痛之肩部疼痛、關節痛、肌肉痛、腱鞘炎(手及手腕疼痛)、肘部疼痛(網球肘等)、跌打、挫傷

用法及用量

請揭開表面剝離層(薄膜)，1 天 1 次敷貼於患處。
(用法及用量的相關注意事項)

- 請嚴格遵守用法與用量。(2) 本藥劑並不能根治疼痛及腫脹之疾病，而是僅治療疼痛及腫脹等症狀，因此請僅在出現症狀時使用。(3) 1 日用量不要超過 8 片。(4) 出汗，或患處濕漉時，請將其擦拭乾淨後使用。(5) 皮膚較為敏感者，請於使用前先在手臂內側較敏感部位，敷貼約 1~2cm 大小之切片，並持續半天以上。確認未出現皮疹、發紅、搔癢或過敏等反應後，再行使用。

成分及含量 (每 100g 膏體中)

成分	含量	作用
Loxoprofen sodium hydrate	5.67g (按無水物計算為 5g)	抑制炎症與疼痛之根源【前列腺素】。

添加物：Styrene-Isoprene-Styrene Block Copolymer, Polyisobutylene, Hydrogenated Rosin Glycerol Ester, BHT, I-Menthol, Liquid Paraffin, and 2 other ingredients

[每片 (5cm×7cm) 含膏量 0.5g]

保管及使用上的注意事項

- 請避免陽光直射，並保管於潮氣小的陰涼處。(2) 請保管於兒童無法觸及的地方。(3) 請不要移至其他容器中(會導致誤用或變質)。(4) 為保證其品質，請在打開包裝後，將未使用的貼布裝入口袋，並將口袋封條密封好後保管。(5) 請勿使用已超過所標示使用期限之產品。在打開鋁包裝袋後，請盡快將其使用。

有關本品資訊，請向所購買之店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫藥保健株式會社 顧客諮詢窗口
郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10
電話號碼 0120-337-336
受理時間 9:00~17:00 (週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>
01 註冊商標

銷售商
第一三共醫藥保健株式會社
Daiichi-Sankyo 東京都中央區日本橋 3-14-10

副作用被害救濟制度
電話號碼 0120-149-931

MADE IN JAPAN

生產銷售商

LEAD CHEMICAL 株式會社
富山縣富山市日俣 77-3

