

使用前請務必閱讀本說明書。

同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時取閱。

指定第2類醫藥品

對伴有咳嗽、痰的感冒症狀具有良好療效

ルルアタック®CXプレミアム
Lulu Attack®CX Premium

Lulu Attack CX Premium 的特點

抑制造成難耐感冒症狀的【炎症】的綜合感冒藥。

1. 抗炎成分異布洛芬 600mg 與甘草酸 39mg 之雙重處方 (每9錠中)。對喉嚨疼痛、發燒等症狀發揮良好療效。
2. 獨家製劑技術，使異布洛芬迅速融化，發揮療效。
3. 在作用於咳嗽中樞的2種鎮咳成分--二氫可待因磷酸鹽、那可汀之外，增加了鹽酸消旋甲基麻黃鹼用於舒張支氣管使呼吸輕鬆，舒緩難纏之咳嗽。祛痰成分卡玻西典使造成咳嗽原因之一的痰液更易排出。
4. 含抗組織胺成分縮水蘋果酸氯芬尼拉明，抑制感冒的過敏症狀 (流鼻水、鼻塞等)。
5. 便於外出攜帶的 PTP 包裝。



使用注意事項



禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故。)

1. 以下情形者請勿服用。

- (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
- (2) 曾因服用本劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥而引發氣喘者
- (3) 未滿15歲的兒童
- (4) 預計在12週內生產的孕婦
- (5) 在醫療機構接受以下疾病之治療或服藥者：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、血液疾患、肝臟病、腎臟病、心臟病、高血壓、以及使用齊多夫定 (立妥威) 之患者

2. 服用本劑的期間，請勿使用以下任何醫藥品。

其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等 (鼻炎用內服藥、暈車藥、抗過敏藥等)

3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。

(可能會引起嗜睡等症狀)

4. 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。

5. 服用前後請勿飲酒。

6. 請勿連續服用超過5天以上。



諮詢事項

1. 有以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
- (2) 孕婦或有可能懷孕者
- (3) 高齡者
- (4) 曾對藥物等產生過敏症狀者
- (5) 有以下症狀者：發高燒、排尿困難
- (6) 被診斷出患有以下疾病者：甲狀腺功能紊亂、糖尿病、青光眼、全身性紅斑狼瘡、混合型結締組織疾病、支氣管哮喘、呼吸功能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症
- (7) 曾患有以下疾病者：
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病、血液疾患、肝臟病、腎臟病

2. 服用後若出現以下症狀，有可能為副作用，此時請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

| 相關部位 | 症狀 |
|--------|---|
| 皮膚 | 發疹、發紅、發癢、出現瘀青 |
| 消化器官 | 噁心、嘔吐、食慾不振、胃部不適感、胃痛、口內炎、胸口灼熱、腹脹、胃腸出血、腹痛、腹瀉、血便 |
| 精神神經系統 | 頭暈、失眠、心情低落 |
| 循環器官 | 心悸 |
| 呼吸器官 | 氣短 |
| 泌尿器官 | 排尿困難 |
| 其他 | 視力模糊、耳鳴、浮腫、流鼻血、牙齦出血、出血不易停止、出血、背痛、身體倦怠 |

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

| 症狀名稱 | 症狀 |
|---------------------|---|
| 休克 (過敏性) | 服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。 |
| 血液障礙 | 出現喉嚨疼痛、發燒、全身倦怠、臉部或眼皮內側泛白、容易出血 (牙齦出血、鼻血等)、瘀青 (按壓後也不會消失) 等症狀。 |
| 消化器官障礙 | 出現大便發黑、吐血、血便、黏液血便 (混有血液、黏液、膿液之軟便) 等症狀。 |
| 史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症 | 發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹、發紅、變紅等持續，或者突然惡化。 |
| 肝功能障礙 | 出現發燒、發癢、發疹、黃疸 (皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。 |
| 腎功能障礙 | 出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛 (各關節疼痛)、腹瀉等。 |
| 無菌性腦膜炎 | 出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐等。(尤其是接受全身性紅斑狼瘡或混合型結締組織疾病治療的人當中，通報有多數此類症狀。) |
| 心肌梗塞 | 胸部絞痛、呼吸困難、冒冷汗。 |
| * 腦血管障礙 | 突然出現意識模糊或消失、單側手腳不靈活、頭痛、嘔吐、頭暈、口齒不清、說話吃力等症狀。 |
| * 間質性肺炎 | 爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。 |
| 氣喘 | 呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等症狀。 |
| 再生不良性貧血 | 出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。 |
| 無顆粒性白血球症 | 出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等症狀。 |
| 換氣不足 | 出現氣短、呼吸困難等症狀。 |

3. 服用後，若出現體溫過度下降、虛脫 (體虛無力)、四肢冰冷 (手腳發涼) 等症狀時，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

4. 服用後，可能會出現下列症狀，此症狀持續或加重時請停止服用本劑，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

便秘、口乾、嗜睡

5. 即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

(特別是連續3天或以上發燒、以及反復發燒時)

(續背面)

功效

舒緩感冒的各項症狀 (咳嗽、生痰、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、發燒、惡寒、打噴嚏、頭痛、關節痛、肌肉疼痛)

用法及用量

請依照下述用量，用冷水或溫水送服。

| 年齡 | 1次用量 | 1天服用次數 |
|-------------|--|---------------------|
| 成人 (15歲或以上) | 3錠  | 3次 請盡量於餐後半小時內服用。 |
| 未滿15歲 | 請勿服用。 | |

<用法及用量之相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 錠劑的取出方式

如右圖所示，請用指尖用力按壓裝有錠劑的 PTP 包裝的凸起部分，擠破背面的鋁箔，取出錠劑後服用。(若不慎連同包裝一起誤服，恐將導致刺穿食道黏膜等意外事故。)



成分及含量

本劑為白色膜衣錠，每9錠中含有以下成分。

| 成分 | 含量 | 作用 |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Ibuprofen | 600 mg | 作用於發炎症狀和疼痛源頭的【前列腺素】，發揮抑制喉嚨痛等，及退燒的療效。 |
| Dihydrocodeine Phosphate | 24 mg | 作用於咳嗽中樞，舒緩咳嗽。 |
| Noscapine | 48 mg | |
| dl-Methylephedrine Hydrochloride | 60 mg | 使支氣管擴張，舒緩咳嗽。 |
| L-Carbocisteine | 750 mg | 使氣管黏膜恢復正常，讓引起咳嗽原因之一的痰液更易排出。 |
| Glycyrrhizic acid | 39 mg | 抑制喉嚨與鼻黏膜的發炎症狀。 |
| Chlorpheniramine Maleate | 7.5 mg | 抑制感冒的過敏症狀 (流鼻水、鼻塞等)。 |
| Anhydrous Caffeine | 75 mg | 舒緩頭痛。 |
| Benfotiamine (Vitamin B1 derivative) | 25 mg | 促進恢復因感冒而消耗的體力。 |

添加物：polyoxyethylene hydrogenated castor oil, D-mannitol, cellulose, hypromellose, hydroxypropylcellulose, silicic anhydride, talc, croscarmellose sodium, polyvinyl alcohol (partial Saponified product), triethyl citrate, titanium oxide, carnauba wax

保管及使用上的注意事項

- (1) 請避免陽光直射，保管於潮氣小的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童無法觸及的地方。
- (3) 請不要移至其他容器中 (會導致誤用或變質)。
- (4) 請勿使用已超過所標示使用期限之產品。請在打開鋁包裝袋後12個月以內使用。
- (5) 請在包裝盒的「開封年月日」記錄欄中，填寫打開鋁包裝袋之日期。

為什麼會感冒？

感冒為「喉嚨」及「鼻子」等的「上呼吸道急性炎症性」疾病。當病毒等從喉嚨及鼻子等入侵體內時，會引發過激的炎症反應。其炎症反應會引發喉嚨疼痛、鼻水、咳嗽、痰等呼吸道症狀，嚴重時則會引起發燒等症狀。首先，抑制炎症是舒緩感冒症狀之關鍵。另外，感冒時攝取維他命以及保障良好睡眠也非常重要。



示意圖

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫藥保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00 ~ 17:00 (週六、週日及節假日除外)

有關 Lulu 之詳細資訊請進入網頁 www.lulu.jp

03®註冊商標



生產銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10

公司網頁 <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>