

综合感冒药

指定第2类医药品

对伴有喉咙疼痛、发烧的感冒症状具有良好疗效

ルルアタックEXプレミアム

Lulu Attack®EX Premium

Lulu Attack EX Premium 的特点

抑制难耐感冒症状原因的【炎症】的综合感冒药。

1. 抗炎成分布洛芬 600 mg 与氨甲环酸 750 mg 双重配方 (每9片中)。针对咽喉疼痛、发烧等症状发挥良好疗效。
2. 独家制剂技术, 使布洛芬迅速溶解并发挥疗效。
3. 含抗组胺成分马来酸右氯苯那敏, 抑制感冒的过敏症状 (鼻涕、鼻塞等)。
4. 磷酸双氢可待因与消旋盐酸甲麻黄碱缓解难耐的咳嗽症状。
5. 铝箔泡罩包装方便携带。



使用注意事项



禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化, 或容易出现副作用及事故)

1. 下述人群不要服用。

- (1) 曾因为服用本药剂或本药剂成分出现过过敏反应的人群
- (2) 曾因服用本药剂或其他感冒药、解热镇痛药而出现哮喘症状的人群
- (3) 未满15岁的儿童
- (4) 预产期在12周以内的孕妇
- (5) 在医疗机构接受以下疾病的治疗或用药的人群: 胃溃疡、十二指肠溃疡、血液疾患、肝脏病、肾脏病、心脏病、高血压, 以及使用齐多夫定 (立妥威) 的患者

2. 在服用本药剂期间, 请不要使用下述的任何药品。

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含有抗组胺药的内服药等 (鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等)、含有氨甲环酸的内服药

3. 服用后, 请不要驾驶车辆或操作机械类。

(可能会出现嗜睡症状)

4. 处于哺乳期时不要服用本药剂, 或在服用本药剂时不要进行哺乳。

5. 服用前后请勿饮酒。

6. 不要连续服用超过5天。



咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录销售者。

- (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
- (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
- (3) 高龄人群
- (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
- (5) 有下述症状的人群: 高烧、排尿困难
- (6) 被诊断患有下述疾病的人群: 甲状腺功能障碍、糖尿病、青光眼、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、支气管哮喘、血栓人群 (脑血栓、心肌梗塞、血栓性静脉炎)、可能引发血栓的人群、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症
- (7) 曾患有过以下疾病的人群:
胃及十二指肠溃疡、溃疡性大肠炎、克隆氏病、血液疾患、肝脏病、肾脏病

2. 服用后若出现下述症状, 则可能存在副作用, 此时应立即中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒、出现淤青
消化器官	恶心、呕吐、食欲不振、胃部不适、胃痛、口腔溃疡、烧心、胃胀、肠胃出血、腹痛、腹泻、血便
精神神经系统	头晕、失眠、情绪低落
循环系统	心悸
呼吸系统	气短
泌尿系统	排尿困难
其他	视线模糊、耳鸣、浮肿、鼻血、牙龈出血、出血不止、出血、背部疼痛、全身无力

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症状
休克 (过敏性)	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
血液障碍	出现咽喉疼痛、发烧、全身无力、面部或眼皮背面发白、容易出血 (牙龈出血、鼻血等)、淤青 (按压后颜色也不会消失) 等症状。
消化器官障碍	出现大便发黑、吐血、血便、黏液血便 (混合血液、黏液、脓液的软便) 等症状。
史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松懈症	高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。
肝功能障碍	出现发烧、发痒、起疹、黄疸 (皮肤或眼白发黄)、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
肾损伤	出现发烧、起疹、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛 (各关节疼痛)、腹泻等症状。
无菌性脑膜炎	因颈部抽筋出现剧烈头痛、发烧、恶心及呕吐等症状。(尤其在接受系统性红斑狼疮或混合性结缔组织病治疗的人群中多有该症状的报告案例。)
* 心肌梗塞	胸部绞痛、气闷、冒冷汗。
* 脑血管障碍	突然出现意识模糊或消失、单侧手脚活动不灵、头痛、呕吐、头晕、口齿不清、说话吃力等症状。
间质性肺炎	上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧, 并且突然出现或长时间持续。
哮喘	呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或黏膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适, 难以站稳、血尿等症状。
粒细胞缺乏症	出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。
呼吸抑制	出现气短、呼吸困难等症状。

3. 服用后, 若出现体温过度下降、虚脱 (没有力气)、四肢冰冷 (手脚发凉) 等症状时, 请立即停止服用本剂, 并携带本说明书, 咨询医师、药剂师或登录销售者。

4. 服用后若出现下述症状, 若该症状持续或加重时应中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。 便秘、口渴、嗜睡

5. 若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

(特别是发烧持续3天或以上, 以及反复发烧时)

(续背面)

功能主治

缓解各种感冒症状（咽喉痛、发烧、恶寒、头痛、鼻塞流涕、打喷嚏、咳嗽、有痰、关节痛、肌肉痛）

用法及用量

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
成人（15 岁或以上）	3 片 	3 次 请尽量在餐后半小时内服用。
未满 15 岁	请勿服用。	

〈用法及用量的相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法与用量。
- (2) 片剂取出方法

如右图所示，用手指尖用力按压铝箔泡罩包装突起部，片剂会刺破铝箔，并将其取出。（若错误和铝纸一起直接服用，则会导致刺伤食道黏膜等意外事故）



成分及分量

本药剂是白色薄膜衣片，每 9 片中含有以下成分。

成 分	分 量	作 用
Ibuprofen	600 mg	作用于炎症与疼痛原因的【前列腺素】，抑制咽喉疼痛等症状，退烧。
Tranexamic acid	750 mg	抑制炎症根源的【纤溶酶】，缓解咽喉肿痛。
d-chlorpheniramine maleate	3.5 mg	抑制感冒的过敏症状（鼻涕、鼻塞等）。
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg	舒张支气管，镇咳。
Dihydrocodeine phosphate	24 mg	作用于咳嗽中枢，镇咳。
Anhydrous caffeine	75 mg	缓解头痛。
Benfotiamine (Vitamin B1 derivative)	25 mg	促进恢复因感冒而消耗的体力。
Riboflavin (Vitamin B2)	12 mg	保持咽喉与鼻子等的黏膜健康。

添加剂：polyoxyethylene hydrogenated castor oil, hypromellose, D-mannitol, cellulose, hydroxypropylcellulose, silicic anhydride, talc, croscarmellose sodium, polyvinyl alcohol (partial Saponified product), triethyl citrate, titanium oxide, carnauba wax

〈成分及分量有关注意事项〉

本药剂所含核黄素（维生素 B₂）会使尿液变黄。


保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射，保管于湿气小的阴凉处。
- (2) 请保管于儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- (4) 请勿使用超过标注使用期限的产品。另外，请在打开铝包装袋后12个月或以内使用。
- (5) 请在包装盒的“开封年月日”记录栏中，填写打开铝包装袋的日期。

为何会引发感冒？

感冒为“咽喉”及“鼻子”等的“上呼吸道急性炎症性疾病”。当病毒等从咽喉及鼻子等入侵体内时，会引发过激的炎症反应。该炎症反应会引发咽喉疼痛、鼻涕、咳嗽、痰等呼吸道症状，严重时则会引起发烧。

首先，抑制炎症是缓解感冒症状的关键。另外，感冒时摄取维生素C以及保障睡眠质量也非常重要。



示意图

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮编103-8234 东京都中央区日本桥3-14-10

电话号码 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

有关 Lulu 详细信息请进入网站 www.lulu.jp

03©注册商标



生产销售商

第一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥 3-14-10

公司官网 <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>