

綜合感冒藥

指定第2類醫藥品

對伴有鼻水、鼻塞的感冒症狀具有良好療效

ルルアタック®NXプレミアム

Lulu Attack®NX Premium

Lulu Attack NX Premium 的特點

抑制造成難耐感冒症狀的【炎症】的綜合感冒藥。

1. 抗炎成分異布洛芬 450 mg 與傳明酸 420 mg 之雙重處方 (每6錠中)。
對喉嚨疼痛、發燒等症狀發揮良好療效。
2. 獨家製劑技術，使異布洛芬迅速融化，發揮療效。
3. 含抗組織胺成分右旋縮水蘋果酸氯芬尼拉明抑制感冒的過敏症狀 (流鼻水、鼻塞等)，
碘化異丙腎上腺素從根源抑制鼻水分泌。
4. 二氫可待因磷酸鹽與鹽酸消旋甲基麻黃鹼舒緩難耐之咳嗽。
5. 便於外出攜帶的 PTP 包裝。



使用注意事項



禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故。)

1. 以下情形者請勿服用。
 - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - (2) 曾因服用本劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥而引發氣喘者
 - (3) 未滿15歲的兒童
 - (4) 預計在12週內生產的孕婦
2. 服用本劑的期間，請勿使用以下任何醫藥品。
其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等 (鼻炎用內服藥、暈車藥、抗過敏藥等)、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有傳明酸之內服藥
3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。
(可能會引起嗜睡與視力模糊、感覺異常刺眼等症狀)
4. 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。
5. 服用前後請勿飲酒。
6. 請勿連續服用超過5天以上。



諮詢事項

1. 有以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕者
 - (3) 高齡者
 - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀者
 - (5) 有以下症狀者：發高燒、排尿困難
 - (6) 被診斷出患有以下疾病者：甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、青光眼、全身性紅斑狼瘡、混合型結締組織疾病、血栓患者 (腦血栓、心肌梗塞、血栓性靜脈炎等)、可能會引發血栓症的人、呼吸功能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症
 - (7) 曾患有以下疾病者：
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病

2. 服用後若出現以下症狀，有可能為副作用，此時請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、出現瘀青
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃部不適感、胃痛、口內炎、胸口灼熱、腹脹、胃腸出血、腹痛、腹瀉、血便
精神神經系統	頭暈、頭痛
循環器官	心悸
呼吸器官	氣短
泌尿器官	排尿困難
其他	視力模糊、耳鳴、浮腫、流鼻血、牙齦出血、出血不易停止、出血、背痛、過度的體溫低下、身體倦怠、臉發燙、異常眩暈

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
史蒂芬強森症候群、 中毒性表皮壞死鬆解症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹、發紅、變紅等持續，或者突然惡化。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸 (皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛 (各關節疼痛)、腹瀉等。
* 無菌性腦膜炎	出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐等。(尤其是接受全身性紅斑狼瘡或混合型結締組織疾病治療的人當中，通報有數此類症狀。)
* 心肌梗塞	胸部絞痛、呼吸困難、冒冷汗。
腦血管障礙	突然出現意識模糊或消失、單側手腳不靈活、頭痛、嘔吐、頭暈、口齒不清、說話吃力等症狀。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等症狀。
再生不良性貧血	出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。
無顆粒性白血球症	出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等症狀。
換氣不足	出現氣短、呼吸困難等症狀。

3. 服用後，可能會出現下列症狀，此症狀持續或加重時請停止服用本劑，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
便秘、口乾、嗜睡

4. 即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

(特別是連續3天或以上發燒、以及反復發燒時)

(續背面)

功效

舒緩感冒的各項症狀（鼻水、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽、有痰、發燒、惡寒、打噴嚏、頭痛、關節痛、肌肉疼痛）

用法及用量

請依照下述用量，用冷水或溫水送服。

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
成人（15 歲或以上）	2 錠 	3 次 請盡量於餐後半小時內服用。
未滿 15 歲	請勿服用。	

<用法及用量之相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 錠劑的取出方式

如右圖所示，請用指尖用力按壓裝有錠劑的 PTP 包裝的凸起部分，擠破背面的鋁箔，取出錠劑後服用。（若不慎連同包裝一起誤服，恐將導致刺穿食道黏膜等意外事故。）



成分及含量

本劑為白色膜衣錠，每 6 錠中含有以下成分。

成 分	含 量	作 用
Ibuprofen	450 mg	作用於發炎症狀和疼痛源頭的【前列腺素】，發揮抑制喉嚨痛等，及退燒的療效。
Tranexamic Acid	420 mg	抑制炎症根源之【血纖維蛋白溶解酶】，舒緩喉嚨腫痛。
Isopropamide Iodide	6 mg	從根源抑制鼻水分泌
d-Chlorpheniramine Maleate	3.5 mg	抑制感冒的過敏症狀（流鼻水、鼻塞等）。
Dihydrocodeine Phosphate	24 mg	作用於咳嗽中樞，舒緩咳嗽。
dl-Methylephedrine Hydrochloride	60 mg	使支氣管擴張，舒緩咳嗽。
Anhydrous Caffeine	75 mg	舒緩頭痛。
Riboflavin (Vitamin B2)	12 mg	保持鼻子、喉嚨等黏膜健康。
Hesperidin	90 mg	感冒時易消耗的一種維他命 P。

添加物：polyoxyethylene hydrogenated castor oil, D-mannitol, cellulose, lactose, hypromellose, hydroxypropylcellulose, silicic anhydride, talc, croscarmellose sodium, polyvinyl alcohol (partial Saponified product), titanium oxide, carnauba wax

<成分及含量之相關注意事項>

本劑所含核黃素（維他命 B2）會使尿液變黃。

保管及使用上的注意事項

- (1) 請避免陽光直射，保管於潮氣小的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童無法觸及的地方。
- (3) 請不要移至其他容器中（會導致誤用或變質）。
- (4) 請勿使用已超過所標示使用期限之產品。請在打開鋁箔包裝袋後12個月以內使用。
- (5) 請在包裝盒的「開封年月日」記錄欄中，填寫打開鋁箔包裝袋之日期。

為什麼會感冒？

感冒為「喉嚨」及「鼻子」等的「上呼吸道急性炎症性疾病」。當病毒等從喉嚨及鼻子等入侵體內時，會引發過激的炎症反應。其炎症反應會引發喉嚨疼痛、鼻水、咳嗽、痰等呼吸道症狀，嚴重時則會引起發燒等症狀。首先，抑制炎症是舒緩感冒症狀之關鍵。另外，感冒時攝取維他命以及保障良好睡眠也非常重要。



示意圖

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫藥保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00 ~ 17:00 (週六、週日及節假日除外)

有關 Lulu 之詳細資訊請進入網頁 www.lulu.jp

03®註冊商標



Daiichi-Sankyo

銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10

公司網頁 <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

生產銷售商

佐藤藥品工業株式會社

奈良縣橿原市觀音町 9-2