

ルルアタック[®]TR

Lulu Attack TR 感冒藥

綜合感冒藥

指定第2類医薬品



效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（喉嚨疼痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、有痰、發燒、發冷、頭痛、關節痛、肌肉痛）

用法與用量 / 使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人(15歲以上)	2粒	1天2次， 請儘量在早晚飯後30分鐘內服用。
未滿15歲	請勿服用。	

<用法與用量相關注意事項>

(1) 請嚴格遵守用法與用量。

成分與份量

本品為一半白色一半橘紅色的膠囊，每4粒中含有以下藥效成分。

成分	份量
Ibuprofen	400 mg
Glycyrrhizic acid	26 mg
Isopropamide iodide	5 mg
d-chlorpheniramine maleate	3.5 mg
Dextromethorphan hydrobromide hydrate	48 mg
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg
Anhydrous caffeine	75 mg

添加物: D-mannitol, cellulose, CMC-Ca, hydroxypropyl cellulose, yellow 5, acrylic acid ethyl methyl methacrylate copolymer, talc, hypromellose, polyvinyl alcohol acrylic acid methyl methacrylate copolymer, silicon dioxide, sodium lauryl sulfate, gelatin

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故)

1. 以下情形者請勿服用。
 - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥，感冒藥而引起氣喘的人
 - (3) 未滿15歲的兒童
 - (4) 生產預定日期在12週以內的孕婦
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、
含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）、胃腸鎮痛鎮痙藥
3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置（可能會引起嗜睡與視力模糊、感覺異常刺眼等症狀）
4. 服用前後請勿飲酒。
5. 請勿連續服用超過5天以上。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (3) 哺乳期媽媽
 - (4) 高齡者
 - (5) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (6) 有以下症狀的人
發高燒、排尿困難
 - (7) 被診斷出患有以下疾病的人
甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、青光眼、系統性紅斑狼瘡、混合型結締組織疾病
 - (8) 曾患有以下疾病的人
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病