

止癢貼布 為半透明貼片，不引人注目。防止抓破。

日本製

マキロン® パッチエース

Makiron 止癢貼布 ACE

止癢消炎藥



指定第2類医薬品

效能與效果

蚊蟲咬傷引起的發癢

用法與用量 / 使用方法

1天1~3次貼於患部。

< 使用方法相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守使用方法。
- (2) 讓兒童使用時，須有家長在旁指導監督。
- (3) 僅可作為外用。
- (4) 流汗、皮膚潮溼時，請先充分擦乾再行使用。
- (5) 使用數小時後不再發癢時，請將本貼布撕下。
- (6) 請勿長時間使用於相同部位。

成分與份量

本產品膏體 100g (1.25m²) :

成分	份量
Dexamethasone acetate	0.025g
Diphenhydramine	1.00g
Isopropyl methylphenol	1.00g
Tocopherol acetate (acetate ester of vitamin E)	0.50g

添加物 : Diisopropyl adipate, methacrylate/ butylacrylate copolymer, BHT, *l*- menthol

本劑含有副腎皮質荷爾蒙 (類固醇) 的 Dexamethasone acetate。

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

1. 請勿使用於以下的部位。
 - (1) 水痘（水疱瘡）、香港腳 / 白癬等或化膿的患部
 - (2) 眼睛周圍、黏膜等
 - (3) 傷口、溼潤（抓破皮膚）、潰爛、斑疹、溼疹
2. 臉部請勿大範圍使用。
3. 請勿長期連續使用。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，使用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (3) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (4) 大範圍患部的人