

止痒贴 半透明贴片，贴后不明显。防止抓伤。

日本制造

# マキロン®パッチエース

Makiron 止痒贴 Ace

痒消炎药

指定第2類医薬品



## 功能主治

蚊虫叮咬导致的瘙痒

## 用法用量 / 使用方法

每天1~3次贴于患处。

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守使用方法。
- (2) 儿童使用时，需在家长的监督指导下使用。
- (3) 本品仅限外用。
- (4) 如已经出汗或皮肤已被浸湿，请先将水分擦干。
- (5) 请不要将止痒贴长时间贴在同一位置。

## 成分、分量

本品每100g膏体(1.25m<sup>2</sup>)中

成分	分量
Dexamethasone acetate	0.025g
Diphenhydramine	1.00g
Isopropyl methylphenol	1.00g
Tocopherol acetate (acetate ester of vitamin E)	0.50g

添加剂：Diisopropyl adipate, methacrylate/ butylacrylate copolymer, BHT, *l*-menthol

本品中加入了糖皮质激素(类固醇)——Dexamethasone acetate。

## 使用注意事项

### 禁忌事项

(如违反禁忌事项, 可能会引起症状恶化或引发副作用)

1. 请勿将本品用于下述部位。
  - (1) 患有水痘、脚气、体癣等部位或化脓部位
  - (2) 眼睛周围、粘膜等
  - (3) 伤口、潮湿部位 (被挠破的部位)、溃疡、湿疹、皮疹
2. 请不要将本品大范围涂抹于脸部。
3. 请勿长期使用本品。

### 需遵医嘱的情况

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。
  - (1) 正在接受医生治疗的人群
  - (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
  - (3) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
  - (4) 患处较大的患者