

服用前請務必閱讀本說明書。同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時取閱。

要指導醫藥品

緊急避孕藥

ノルレボ®
NORLEVO®

產品特點

- NORLEVO®為女性服用之緊急避孕藥。
- 緊急避孕藥是，您在未採取避孕措施進行性交，或發生保險套破裂等避孕失敗時，為了防止懷孕而服用的藥物。
- 服用本藥劑無法完全防止懷孕。請在服用的3週後，透過使用驗孕試劑或就診醫療機構確認是否懷孕。若驗孕試劑結果為陽性，請儘速前往醫療機構就診。
- 在性交前服用本藥劑無法防止懷孕。
- NORLEVO®必須在性交後72小時內服用。
- 請在接受經過培訓的藥劑師關於服用前確認及服用後注意事項的說明後，購買1錠本藥劑，並在經過培訓的藥劑師面前服用。

⚠ 使用注意事項



禁止事項

(若不遵守可能容易產生副作用。)

1. 以下情形者請勿服用。
 - (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分而引發過敏症狀者
 - (2) 被診斷出患有以下疾病者
 - 肝臟病
 - (3) 孕婦
 - (4) 男性
2. 哺乳期婦女應避免服用本藥劑，或在服用後至少24小時內避免哺乳。



諮詢事項

1. 有以下情形者，服用前請先向藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 曾對藥物等產生過敏症狀者
 - (3) 被診斷出患有以下疾病者
 - 心臟病
 - 腎臟病
 - 阻礙食物或藥物吸收的嚴重消化器官疾病
 - (4) 正在攝取含有聖約翰草 (St. John's wort) * 的食品者

* 聖約翰草是原產於歐洲和亞洲的金絲桃科多年生植物，自然生長於山野。其萃取物在德國作為抗鬱劑使用，在日本則作為健康輔助食品販售。
2. 服用後若出現下述症狀，有可能為副作用，此情形時請攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師：

相關部位	症狀
消化器官	噁心、嘔吐、下腹部疼痛、腹瀉、腹痛
精神神經系統	頭痛、嗜睡、頭暈、焦慮
生殖器官	陰道異常出血、月經失調 (經血過多、月經延遲)
其他	貧血、倦怠感、疲勞、漂浮感、口乾、灼熱感、手腳浮腫、乳房壓痛 (按壓或觸碰乳房時產生的疼痛)

3. 服用後若出現下述症狀，有可能存在懷孕等情形，此情形時請立即攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。
 - (1) 月經 (生理) 比預期**晚7天或以上仍未到來時
 - (2) 類似月經 (生理) 的出血或頭痛、噁心、倦怠感、嗜睡等月經 (生理) 時及懷孕初期的症狀持續7天或以上時
 - (3) 月經 (生理) 比預期**提前到來，或經血量與往常不同時

**指服用本藥劑前最近一次月經 (生理) 開始的日期起約1個月後 (以28天週期計算時)

(續背面)



其他注意事項

1. 若在服用本藥劑前已懷孕，則本藥劑無效。
已懷孕的女性請勿服用本藥劑。
2. 本藥劑是用於性交後緊急防止懷孕的藥物。
服用本藥劑後仍有可能懷孕，若為有計劃避孕時，請繼續採用低劑量口服避孕藥等避孕效果較高的方法。
3. 服用本藥劑後，無法立即判斷是否有效。請在服用的 3 週後，透過使用驗孕試劑或就診醫療機構確認是否懷孕。
若驗孕試劑結果為陽性，請儘速前往醫療機構就診。

功效

緊急避孕

< 功效之相關注意事項 >

- (1) 服用本藥劑並不能完全防止懷孕。
- (2) 本藥劑是用於未採取避孕措施或避孕失敗的性交後防止懷孕的藥物，在性交前服用本藥劑無法防止懷孕。
- (3) 服用本藥劑後仍有可能懷孕，請採取適當的避孕措施。

用法及用量

請在性交後 72 小時內從藥劑師領取 1 錠本藥劑，並當場服用。

< 用法及用量之相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法及用量。有必要時，請儘速服用本藥劑。
- (2) 服用前請接受藥劑師關於服用前確認及服用後注意事項的說明。
- (3) 錠劑的取出方式
請用指尖用力按壓裝有錠劑的 PTP 包裝的凸起部分，擠破背面的鋁箔，取出錠劑後服用。
(若不慎連同包裝一起誤服，恐將導致刺穿食道黏膜等意外事故。)



成分及含量

每 1 錠中

成分	含量	作用
Levonorgestrel	1.5 mg	據研究，本成分可透過抑制排卵、阻礙受精、阻止受精卵在子宮內著床，從而達到防止懷孕的效果。

添加劑：Lactose Hydrate, Corn Starch, Povidone, Light Anhydrous Silicic Acid, Magnesium Stearate

保管及使用上的注意事項

- (1) 請妥善保管外包裝盒與本說明書。
- (2) 請勿服用已超過使用期限之產品。使用期限標示於外包裝盒上。

諮詢窗口

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫藥保健株式會社 顧客諮詢窗口
 郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10
 電話號碼 0120-337-336
 受理時間 9:00 ~ 17:00 (週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®註冊商標



生產銷售商
ASKA 製藥株式會社
 東京都港區芝浦二丁目 5 番 1 號



銷售商
第一三共醫藥保健株式會社
 東京都中央區日本橋 3-14-10