

使用前请务必阅读本说明书。
同时应对此说明书进行妥善保管，以方便在必要时取阅。

01

口腔咽喉药

第3类医药品

针对咽喉疼痛、咽喉肿胀

ペラックT錠^a

PELACK®T 片剂 a

含有抗炎成分

PELACK T 片剂 a 的特点

PELACK T 片剂 a 不仅含有具备抑制炎症及过敏作用的氨甲环酸、甘草粗提取物，还配有帮助蛋白质、脂质代谢，促进皮肤及黏膜正常作用的维生素 B2、维生素 B6，以及维生素 C 的 3 种维生素。有效针对因空气干燥、污染及感冒等原因所导致的咽炎、扁桃体炎（咽喉疼痛、咽喉肿胀）等咽喉炎症，7 岁及以上儿童亦可服用。

- 含有氨甲环酸
成年人（15 岁及以上）1 天服用量中含有 750mg 具备抑制炎症及过敏作用的氨甲环酸。
- 针对咽喉疼痛、咽喉肿胀发挥良好疗效
氨甲环酸、甘草粗提取物的 2 种成分有效发挥作用，抑制咽喉炎症。
- 不含嗜睡成分
不含抗组胺剂，不嗜睡。

⚠ 使用注意事项

⊗ 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

1. 在服用本品期间，不要服用下述任何医药品。
 - (1) 含有甘草或其主成分甘草酸的内服药
（会造成浮肿、血压上升及肌肉疾病（肌病）等症状）
 - (2) 含有氨甲环酸的内服药
（鼻炎用内服药、感冒药、解热镇痛药、镇咳祛痰药等）
2. 不要长期连续服用。



咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 - (1) 正在接受医师或牙科医师治疗的人群
 - (2) 孕妇或有其可能性的人群
 - (3) 高龄者
 - (4) 曾因药物等出现过敏症状的人群
 - (5) 拥有以下症状的人群：
浮肿
 - (6) 接受以下诊断的人群：
高血压、心脏病、肾脏病、患有血栓的人群（脑血栓、心肌梗塞、血栓性静脉炎等）、可能出现血栓症的人群
2. 服用后若出现下述症状，则可能为副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相 关 部 位	症 状
皮 肤	起疹、发红、发痒
消 化 系 统	恶心、呕吐、烧心、食欲不振或食欲增加、胃部不适
精神神经系统	头晕
泌 尿 系 统	尿频

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症 状
假性醛固酮增多症、肌病	除四肢无力、发麻、抽筋、僵硬等症状之外，还出现乏力感、肌肉疼等症状，并且逐渐加重。

3. 服用后有可能出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。
腹泻
4. 若服用5~6天后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

功能主治

咽炎、扁桃体炎（咽喉疼痛、咽喉肿胀），口腔溃疡

用法及用量

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年龄	1次用量	1天服用次数
成年人（15岁及以上）	2片	3次 请在早中晚各服用一次。
7岁及以上未满15岁	1片	
未满7岁	请勿服用。	

<用法及用量相关注意>

- (1)请严格遵守用法及用量。
- (2)餐前、餐后均可服用。
- (3)7岁或以上儿童需在监护人的指导监督下服用本品。
- (4)片剂取出方法

如右图所示，用手指尖用力按压PTP泡罩包装突起部，片剂会刺破铝箔，并将其取出。

（一定要将片剂完全取出后服用，否则会导致包装刺伤食道黏膜等意外事故）



成分及含量

本品为淡黄色薄膜衣片，每6片中含有以下成分。

成分	含量	作用
Tranexamic Acid	750 mg	患有炎症及过敏症状时，该成分抑制体内异常增加的酶（纤溶酶），改善口腔及咽喉疼痛、肿胀等症状。
Crude Glycyrrhiza Extract	198 mg (相当于原生药990 mg)	该成分为生药甘草提取物，其主要成分为甘草酸，具有抑制炎症及过敏的作用。
Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6)	50 mg	具有促进皮肤及黏膜发挥正常功能的作用。
Riboflavin (Vitamin B2)	12 mg	
Sodium L-Ascorbate (Vitamin C Sodium)	500 mg	

添加剂： Cellulose, Silicic Anhydride, Hydroxypropylcellulose, Corn Starch, Croscarmellose Sodium, Talc, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium Oxide, Macrogol, Iron Sesquioxide, Carnauba Wax

<成分及含量的相关注意>

- (1) 本品含有的核黄素（维生素B2）可能会导致尿液颜色变黄。
- (2) 服用本品可能会对尿液及粪便检查结果产生影响。
在医院进行检查时，请提前告知医生正在服用含有维生素C的制剂。

保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射，保管在潮气小的阴凉处。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- (4) 请勿使用超过标注使用期限的产品。另外，请在打开铝制包装袋后6个月以内使用。
- (5) 请在包装盒的“开封年月日”记录栏中写下打开铝制包装袋的日期。

有关本产品信息，请咨询购买其的药局或以下联系窗口。

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10

电话号码 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00（周六、周日及节假日休息）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®注册商标



销售商

第一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥3-14-10

生产销售商

滋贺县制药株式会社

滋贺县甲贺市甲贺町泷 879 番地