

使用前請務必閱讀本說明書。  
同時應對此說明書進行妥善保管，以方便在必要時取閱。

01

口腔咽喉藥

第3類醫藥品

針對喉嚨疼痛、喉嚨腫脹

# ペラックT錠<sup>a</sup>

PELACK®T錠<sup>a</sup>

含有抗炎成分

## PELACK T錠<sup>a</sup>之特點

PELACK T錠<sup>a</sup>不僅含具備舒緩炎症及過敏作用之妥內散酸、甘草粗萃取物，還配有幫助蛋白質、脂質代謝，促進皮膚及黏膜正常作用之維他命 B2、維他命 B6，以及維他命 C 之 3 種維他命。有效針對因空氣乾燥、污染及感冒等原因所導致之咽炎、扁桃體炎（喉嚨疼痛、喉嚨腫脹）等咽喉炎症，7 歲及以上兒童亦可服用。

### ●含有妥內散酸

成人（15 歲或以上）1 天服用量中含 750mg 具備抑制炎症及過敏症作用之妥內散酸。

### ●針對喉嚨疼痛、喉嚨腫脹發揮良好療效

妥內散酸與甘草粗萃取物的 2 種成分有效發揮作用，抑制咽喉炎症。

### ●不含嗜睡成分

不含抗組織胺劑，不嗜睡。



## 使用上注意事項



### 禁止事項

（若不遵守則會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用）

1. 服用本藥劑期間，請勿服用以下任何醫藥品。

(1)含有甘草或其主成分甘草酸之內服藥

（會造成浮腫、血壓上升及肌肉疾病（肌病）等症狀）

(2)含有妥內散酸之內服藥

（鼻炎用內服藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮咳祛痰藥等）

2. 請勿長期連續服用。



### 諮詢事項

1. 下述人群請在服用前諮詢醫師、藥師或登錄販賣者。

(1)正在接受醫師治療或牙科醫師治療的人群

(2)孕婦或有可能懷孕的人群

(3)高齡者

(4)曾因藥物等出現過敏症狀之人群

(5)擁有以下症狀之人群：

浮腫

(6)被診斷出患有以下疾病之人群：

高血壓、心臟病、腎臟病、血栓患者（腦血栓、心肌梗塞、血栓性靜脈炎等）、可能會引發血栓症者

2. 服用後若出現下述症狀，則可能產生副作用，此時應立即中止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、燒心、食慾不振或食慾增加、胃部不適
精神神經系統	頭暈
泌尿器官	頻尿

偶爾會出現下述重症。此時請立即就醫。

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌肉病變	除了四肢無力、發麻、抽筋、僵硬等症狀之外，還出現乏力感、肌肉痛等症狀，並且逐漸加重。

3. 服用後，可能會出現下列症狀之情形，此症狀情形持續或變嚴重時請停止服用本藥劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥師或登錄販賣者。

腹瀉

4. 服用5~6天後症狀無改善時，請停止服用本藥劑，並攜帶本說明書並向醫師、藥師或登錄販賣者諮詢。

## 功效

咽炎、扁桃體炎（喉嚨疼痛、喉嚨腫脹）、口腔潰瘍

## 用法·用量

請依照下述用量用冷水或溫水送服。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人 (15歲或以上)	2錠	3次 請於早中晚各服用一次。
7歲或以上 未滿15歲	1錠	
未 滿 7 歲	請勿服用。	

### <用法及用量的相關注意事項>

- (1)請嚴格遵守用法及用量。
- (2)餐前、餐後均可服用。
- (3)7歲或以上兒童需在監護人之指導監督下服用本藥劑。
- (4)藥錠取出方法

如右圖所示，用手指尖用力按壓PTP包裝突起部，藥錠會刺破鋁箔，並將其取出服用。

(若錯誤和鋁紙一起直接服用，則會導致刺傷食道黏膜等意外事故)



## 成分·含量

本藥劑為淡黃色膜衣錠，每6錠中含有以下成分。

成分	含量	作用
Tranexamic Acid	750 mg	患有炎症及過敏症狀時，該成分抑制體內異常增加之酶（纖維蛋白溶解酶），改善口腔及喉嚨疼痛、腫脹等症狀。
Crude Glycyrrhiza Extract	198 mg (相當於原生藥 990 mg)	該成分為生藥甘草萃取物，其主要成分為甘草酸，具有抑制炎症及過敏之作用。
Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6)	50 mg	具有促進皮膚及黏膜發揮正常功能之作用。
Riboflavin (Vitamin B2)	12 mg	
Sodium L-Ascorbate (Vitamin C Sodium)	500 mg	

添加物：Cellulose, Silicic Anhydride, Hydroxypropylcellulose, Corn Starch, Croscarmellose Sodium, Talc, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium Oxide, Macrogol, Iron Sesquioxide, Carnuba Wax

### <成分及含量的相關注意事項>

- (1)本藥劑所含之核黃素（維他命B2）可能會導致尿液顏色變黃。
- (2)服用本藥劑後，可能會對尿液及糞便的檢查值造成影響。  
接受醫師檢查時，請提前告知醫師正在服用含有維他命C之製劑。

## 保管及使用上的注意事項

- (1)請避免陽光直射，保管在潮氣小的陰涼處。
- (2)請保管在兒童無法觸及的地方。
- (3)請不要移至其他容器中（會導致誤用或變質）。
- (4)請勿使用已超過所標示使用期限之產品。另外，請在打開鋁製包裝後6個月之內使用。
- (5)請在包裝盒的「開封年月日」記錄欄中寫下打開鋁製包裝袋的日期。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫藥保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00~17:00 (週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®註冊商標



銷售商  
第一三共醫藥保健株式會社  
Daiichi-Sankyo 東京都中央區日本橋3-14-10

生產銷售商  
滋賀縣製藥株式會社  
滋賀縣甲賀市甲賀町瀧 879 番地