

# トラフル<sup>®</sup>軟膏PROクイック

Traful 軟膏 PRO Quick

口腔潰瘍治疗用药

指定第2類医薬品



## 功能主治

口腔潰瘍（口瘡）

如下图所示，本品所能治疗的口腔潰瘍（口瘡）是一种炎症的统称。指口腔内侧和舌头、嘴唇里侧出现1～多个周围发红、中间呈凹陷白色圆点且同时伴有疼痛的小型潰瘍（直径10mm以下）。



## 用法用量 / 使用方法

每天1～数次，取适量软膏涂抹于患处。

< 使用注意 >


- (1) 请严格遵守用法与用量。
- (2) 儿童需在监护人的监督指导下使用本品。
- (3) 请不要将本品用于口腔以外的部位。
- (4) 缓解症状之后请停止使用。
- (5) 涂抹之后一段时间，请尽量避免进食。
- (6) 请勿使用于假牙粘合等治疗以外的目的。

Traful 软膏的使用方法

1. 使用本品前，请先漱口清洁口腔。
2. 涂抹时，请用本品完全覆盖住患处。
3. 涂抹后，请尽量不要碰触患处。

（管口的开封方法）

翻转盖子，用内侧的突起部位插入管口，打开一个小洞。



## 成分、分量

本剂为白色～淡黄色的软膏，每100g中含有以下成分：

成分	分量
Triamcinolone acetonide	0.1mg

添加剂：Glycerin, gelatinized hydrocarbon, sodium polyacrylate, hypromellose, Hardened oil, Cellulose gum, l-menthol, sodium saccharate

## 使用注意事项

### 禁忌事项

(不遵守禁忌事项, 可能会使症状恶化或引发副作用)

1. 下列人群请勿使用本品。

(1) 可能患上感染性口腔溃疡的人群 (请前往咨询医生、牙科医生或药剂师)

· 整个口腔内部长满白斑, 且用纱布等擦拭即可轻易擦掉 (可能感染了念珠菌)。

· 患处流出黄色脓液的人群 (可能感染了细菌)。

· 口腔内常出现米粒~小豆大小水疱的人群, 口腔粘膜以外的部位——嘴唇、皮肤上也长出水疱或疹子的人群 (有可能感染了病菌)。

· 出现发烧、食欲不振、全身疲倦、淋巴结肿胀等全身症状的人群 (有可能感染了病菌)。

(2) 同时出现口腔内部感染的人群

(有报告称使用甙体制剂会导致感染恶化, 所以请勿将本品贴在患有牙槽脓肿、牙龈炎等口腔内部感染的部位)

(3) 连续使用五天也没有缓解病症的人群

(4) 使用1~2天后症状出现恶化的人群

### 需遵医嘱的情况

1. 下列人群在使用前, 请前往咨询医生、牙科医生或药剂师。

(1) 正在接受过医生或牙科医生治疗的人群

(2) 正在孕期或备孕中的人群

(3) 正在哺乳期的人群

(4) 高龄人群

(5) 曾出现药物过敏等过敏反应的人群

(6) 患处较大的人群