

针对肝斑 含有氨甲环酸

## TRANSINO トランシーノ®II

TRANSINO II

色斑（仅针对肝斑）改善药

第1类医药品



## 功能主治

色斑（仅针对肝斑）

## 用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次服用量	1天服用次数
成人（15岁及以上）	2片	2次 请在餐后服用
未满15岁	请勿服用。	

〈关于用法及用量的注意事项〉

(1) 请严格遵守用法用量。

## 其他注意事项

- 本品连续服用不得超过2个月。但建议坚持服用1个月左右，以观察本品效果。
- 停药后如再次出现肝斑，请在间隔至少2个月以后再继续服用本品。  
再次开始服药后，连续服用也不得超过2个月。

## 成份、含量

每 4 片中含有以下成分。

成份	含量
Tranexamic acid	750 mg
L-cysteine	240 mg
Ascorbic acid (vitamin C)	300 mg
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B <sub>6</sub> )	6 mg
Calcium pantothenate	24 mg

添加剂: calcium lactate, crystalline cellulose, croscarmellose Na, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, hypromellose, macrogol, talc, titanium oxide, iron sesquioxide, carnauba wax

〈有关成份、含量的注意事项〉

服用本剂可能会对尿液及粪便化验结果产生影响。

就医检查时, 请提前告知医师正在服用含有维生素 C 的制剂。

## 使用注意事项

### 禁忌事项

(若不遵守则会导致当前症状恶化, 或容易产生副作用)

1. 下述人群不要服用。  
正接受透析疗法的人群 (可能会产生痉挛)
2. 在服用本品期间, 不要服用下述医药品。  
含有氨甲环酸的内服药

### 咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师或药剂师。
  - (1) 正在接受医师或牙科医师治疗的人群
  - (2) 孕妇或有其可能性的人群
  - (3) 哺乳期的人群
  - (4) 55 岁或其以上的人群
  - (5) 曾有药物过敏史的人群
  - (6) 患有血栓性疾病的人群 (脑血栓、心肌梗塞、血栓性静脉炎、肺栓塞等)
  - (7) 有可能会罹患血栓性疾病的人群 (曾经患有血栓性疾病的人群、拥有血栓性疾病家族史的人群、曾被医师告知疑似患有先天性凝血障碍的人群、服用口服避孕药及接受激素补充治疗等, 正在服用有可能引发血栓性疾病药物的人群)
  - (8) 接受以下诊断的人群:  
肾脏病