



ロキソニン® 解熱鎮痛薬シリーズラインアップ



製品		ロキソニン® S プレミアム		ロキソニン® S プレミアムファイン		ロキソニン® S クイック	ロキソニン® S プラス		ロキソニン® S
おすすめポイント		なんとかしたい、つらい頭痛に 2種の鎮痛補助成分を追加配合		つらい生理痛に 生理痛のメカニズムを考えた独自処方		頭痛・生理痛に、0.1秒でも速く さらに、胃を守る成分配合	生理痛・頭痛に 胃にやさしい成分をプラス		突然の頭痛・発熱などの常備薬に ベーシックなロキソニンS
包装		12錠 (6回分)	24錠 (12回分)	12錠 (6回分)	24錠 (12回分)	12錠(12回分)	12錠(12回分)		12錠(12回分)
有効成分	ロキソプロフェンナトリウム水和物 (鎮痛成分) 痛みや炎症をすばやくおさえる	○		○		○	○		○
	アリルイソプロピルアセチル尿素 (鎮静成分) 鎮痛効果を高める	○		-		-	-		-
	無水カフェイン (鎮痛補助成分) 鎮痛効果を助ける	○		-		-	-		-
	シャクヤク乾燥エキス (鎮痛補助成分) 過度な子宮の収縮を抑え、痛みをやわらげる	-		○		-	-		-
	ヘスペリジン (鎮痛補助成分) 血行不良・冷えに伴う痛みの緩和を助ける	-		○		-	-		-
	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム (制酸成分・胃粘膜保護成分) 制酸及び胃粘膜保護作用で胃を守る	○		○		○	-		-
	酸化マグネシウム (制酸成分) 制酸作用で胃にやさしい	-		-		-	○		-
眠くなる成分 (鎮静成分等)		含む (服用後は乗物又は 機械の運転操作はしないで下さい)		含まない (服用後、眠くなりにくい)		含まない (服用後、眠くなりにくい)	含まない (服用後、眠くなりにくい)		含まない (服用後、眠くなりにくい)
1回服用量		1回2錠		1回2錠		1回1錠	1回1錠		1回1錠
1日服用回数		2回※		2回※		2回※	2回※		2回※
製剤特長		-		-		クイックブレイク®製法 (速崩壊タイプ)	-		-
錠剤		 直径8mm ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠		 直径8mm ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠		 直径9mm 白色の素錠	 直径8mm ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠		 直径9mm ごくうすい紅色の素錠
PTP仕様		PTP+アルミピロー包装 		PTP+アルミピロー包装 		両面アルミ包装 	PTP+アルミピロー包装 		PTPシート 

※ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいて下さい。