

トランシーノⅡ購入シート



トランシーノⅡは第1類医薬品です。薬剤師のいる薬局・ドラッグストアでお買い求めください。
下記を予めチェックし薬剤師にこのシートを見せてください。

- 今までに、お薬を服用(使用)してアレルギーを起こしたことはありますか？
- 現在、病院に通院されたり、お医者様に処方されたお薬を服用されたりしていますか？
※血栓症、腎臓病、ホルモン療法、経口避妊薬
- ご家族の中で血栓症の方はいらっしゃいますか？
- 55歳以上は相談することになっていますが、如何でしょうか？
- 現在、妊娠中又は妊娠している可能性がありますか？又は授乳中ですか？

●上記の項目に該当された場合、添付文書を確認してください。

上記に該当する項目はありません。

トランシーノⅡは55歳以上でも健康であれば服用していただけますが、

- 血栓症がある、または起こす恐れがある。
- 腎機能が低下していると思われる。

という方は服用いただけません。

※尚、50歳代後半になるとホルモンバランスの関係で一般的には肝斑は薄れる傾向にあります。

購入にあたり、あわせてトランシーノⅡの服用方法もご確認ください。

- 1回2錠、1日2回朝食夕食後に服用してください。
- お薬の効果が分かるようになるまで、少なくとも1カ月は服用しましょう。
- 臨床データでは、2カ月の服用で肝斑への改善効果を確認していますので、効果的な服用期間を2カ月(8週間)としています。
- 2カ月続けて服用した場合は、一旦服用を中止してください。
肝斑がまた気になりだした場合は、2カ月以上の期間をあけて服用を再開してください。
- トラネキサム酸を含有する内服薬とは併用しないでください。

服用方法を読んだ