

製藥廠家於色斑研究中研發之藥物

TRANSINO®藥用美白系列

医薬部外品



TRANSINO®藥用美白系列
四項堅持

根本美白

徹底保濕

抗老保養^{*1}

對於皮膚
低刺激之處方


低刺激性、無香料、無上色、
已進行敏感測試*2

*1 與年齡相匹配的護理 *2 並非所有使用者皆不會引起過敏反應。

添加有效美白成分「傳明酸」

封鎖製造麥拉寧的「色斑訊息」。

◎麥拉寧生成之機制與傳明酸之作用



〈示意圖〉

經紫外線照射後，皮膚細胞會向黑素細胞傳達製造麥拉寧的訊息。此傳達過程即為「色斑訊息」。有效美白成分傳明酸會封鎖「色斑訊息」中的前列腺素以達成麥拉寧生成的抑制，預防色斑與雀斑。

TRANSINO®藥用 臉部美白面膜

美白面膜

販売名称: DSホワイトシートマスク 医薬部外品

20mL×4片 1800日圓(廠商建議販售價格・未稅)



含有美白成分

美容液 約 65 次份量

含有美容液約65次份量※1的美白成分

封鎖製造麥拉寧的「色斑訊息」。

含有
有效美白成分
傳明酸

讓肌膚變得更具
透明且保水滑嫩


含有有
透明感之
KP*

角質層
淨化成分

深入角質層，
提亮暗沉的肌膚，
快速實感效果。

採用多機能超細纖維材質


絲綢觸感般的材質
緊密貼和肌膚。
切實傳遞
美白成分。



〈示意圖〉：

含有帶給肌膚緊實彈力的*4「Ceracut®」

肌膚
瞬間緊緻
有彈性。



〈示意圖〉

肌膚有彈性！

美白美容液

深入色斑的根源
不會停留在皮膚上濕濕黏黏，
能讓皮膚瞬間吸收

TRANSINO®藥用
美白精華EX

医薬部外品

一日兩次，☀早☾晚使用

販售名稱：DSホワイト美容液
30g 4500日圓 /
50g 6300日圓(廠商建議販售價格・未稅)



美白化妝水

著重於肌膚代謝！
讓肌膚邁向
水嫩滋潤

TRANSINO®藥用
美白淨化化妝水

医薬部外品

一日兩次，☀早☾晚使用

販售名稱：DSホワイトローション
175mL 3600日圓(廠商建議販售價格・未稅)



美白乳液

著重在肌膚活力*！
水嫩地浸透肌膚，
不殘留！

TRANSINO®藥用
美白淨化乳

医薬部外品

一日兩次，☀早☾晚使用

販售名稱：DSホワイトミルク
120mL 3600日圓(廠商建議販售價格・未稅)
* 保持健康的肌膚



抗UV美白防曬

一瓶包含「美白」「乳液」「防曬」
「隔離霜」四大功能

TRANSINO®藥用
日間美白防護

医薬部外品

一天一次，☀早上使用

SPF35
PA+++

販售名稱：DSホワイトUVミルク
40mL 3300日圓(廠商建議販售價格・未稅)



夜用美白乳霜

睡覺亦能美白！
晚上塗用真滋潤

TRANSINO®藥用
美白修復霜

医薬部外品

一天一次，☾晚上使用

販售名稱：DSホワイトNクリーム
35g 4000日圓(廠商建議販售價格・未稅)



美白系列試用組合

備受人氣四樣產品之試用組合

TRANSINO®藥用
美白隨身組合

医薬部外品

美白化妝水 (4包)

美白乳液 (4包)

美白美容液 (4包)

夜用美白乳霜 (2包)

500日圓(廠商建議販售價格・未稅)



TRANSINO®藥用美白系列 使用步驟

早上



每日的保養

晚上



美白化妝水

將肌膚導向
保水清潔狀態

TRANSINO®藥用
美白淨化化妝水

医薬部外品



美白美容液

深入色斑的
生成源頭

TRANSINO®藥用
美白精華EX

医薬部外品



美白乳液

邁向柔嫩滋潤的肌膚

TRANSINO®藥用
美白淨化乳

医薬部外品



抗UV美白防曬

防護白日肌膚受到之傷害

TRANSINO®藥用
日間美白防護

医薬部外品

SPF35
PA+++



彩妝

夜用美白乳霜

透明包裝效果給肌膚完整滋養

TRANSINO®藥用
美白修復霜

医薬部外品



美白面膜

集中美白機能，滋潤肌膚加強彈力

TRANSINO®藥用
臉部美白面膜

医薬部外品



作為特別
保養
一週1~2次

美白：抑制麥拉寧生成，防止色斑與雀斑

常見問答集

Q1. 目前也有在服用色斑與雀斑之藥物，兩者能夠併用嗎？

A1. 是的，可以使用。

Q2. TRANSINO II 的停藥期間亦可使用嗎？

A2. 是的，可以使用。

Q3. 是否會對肌膚造成刺激？

A3. 本處方採用針對肌膚特別溫和的成分，低刺激性、無香料、無上色、已進行敏感測試*。
*並非所有使用者皆不會引起過敏反應。

Q4. 敏感肌是否可以使用的？

A4. 本處方雖對於肌膚較溫和，但未經過敏肌膚之測試。
肌膚較敏感可先於手腕內側測試確認後使用。